

FARMAINFORMA APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA ASL ROMA 2:

INDICATORI SPESA CONVENZIONATA: RIFAXIMINA

Nell'ambito del monitoraggio della spesa convenzionata e con il fine di promuovere l'uso appropriato dei farmaci e il rispetto dei target regionali, si riportano di seguito i dati di spesa della farmaceutica convenzionata riconducibili alle prescrizioni di RIFAXIMINA (ATC: A07AA11) nell'anno 2024.

Flusso	Spesa Netta	Numero Assistiti Trattati
EROGAZIONE SSN (NORMIX)	1.655.206,30 €	53.472
EROGAZIONE DPC (TIXTELLER)	248.691,06 €	271

Secondo quanto riportato nella Determinazione regionale l'utilizzo della *Rifaximina* si deve proporre in coerenza con le indicazioni riportate scheda tecnica.

L'utilizzo "in prevenzione" con cicli mensili non trova indicazione in scheda tecnica.

L'indicatore regionale consentirà di evidenziare i pazienti trattati per un periodo ripetitivo annuo di almeno 3 mesi con il fine di rivederne la prescrizione in maniera congiunta con lo specialista GE.

A tal riguardo si rappresenta che la *rifaximina* è un antibatterico appartenente alla classe delle rifamicine. La molecola forma un legame irreversibile con le subunità *beta* dell'enzima RNA polimerasi DNA dipendente del batterio e conseguentemente inibisce la sintesi dell'RNA batterico.

Da scheda tecnica, la molecola può essere prescritta per:

- ✓ Infezioni intestinali acute e croniche sostenute da batteri gram-positivi e gram-negativi; sindromi diarroiche.
- ✓ Diarrea da alterato equilibrio della flora microbica intestinale (diarree estive, diarrea del viaggiatore, enterocoliti).
- ✓ Profilassi pre e post-operatorie delle complicanze infettive negli interventi di chirurgia del tratto gastroenterico.
- ✓ Coadiuvante nella terapia delle iperammoniemie.

INDICAZIONE TERAPEUTICA	POSOLOGIA	DURATA TERAPIA
TRATTAMENTO ANTIDIARROICO	200 MG o 10 ML/ogni 6 ore	7 giorni
TRATTAMENTO PRE E POST OPERATORIO	400 MG o 20 ML/ ogni 12 ore	
TRATTAMENTO COADIUVANTE DELL'IPERAMMONEMIA	400 o 20 ML/ogni 8 ore	

U.O.C Farmacia Ospedaliera SE/CTO e verifica
appropriatezza prescrittiva ospedale territorio

- ✓ Dati clinici hanno dimostrato che *rifaximina* non è efficace nel trattamento di infezioni intestinali causate da patogeni intestinali invasivi come *Campylobacter jejuni spp*, *Salmonella spp* e *Shigella spp* che normalmente causano diarrea, febbre, sangue nelle feci ed elevata frequenza di evacuazione.
- ✓ Il trattamento dovrebbe essere sospeso se i sintomi peggiorano o persistono per più di 48 ore.
- ✓ Sono stati riportati casi di diarrea associata a *Clostridium difficile* (CDAD) conseguenti all'uso della *rifaximina*.

Si ricorda, inoltre, che nelle ultime linee guida italiane sulla malattia diverticolare non è suggerito alcun trattamento farmacologici con rifaximina.

Si rappresenta, inoltre, che esiste in commercio una formulazione di rifaximina in compresse da 550 mg. Tale formulazione riporta in scheda tecnica una sola indicazione terapeutica autorizzata:

- ✓ **Riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età ≥ 18 anni.**

Per tale indicazione la prescrizione del farmaco è riservata solo ai medici specialisti dei centri prescrittori individuati dalla regione (gastroenterologo, infettivologo, internista). La prosecuzione della terapia può essere prescritta dai MMG, sulla base del PT compilato dal medico specialista. La distribuzione del farmaco avviene solo ed esclusivamente attraverso il canale della DPC.

Visto quanto sopra riportato e considerato l'andamento prescrittivo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione ad un'attenta valutazione della prescrivibilità della molecola in ambito SSN.

Bibliografia

1. Determinazione n. G17982 24/12/2024 la Regione Lazio
2. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0499554.28-06-2019
3. RCP Normix
4. RCP Tixteller
5. M. Carabotti, C. Sgamato, A. Amato, B. Beltrame, G. A. Binda, B. Germanà, G. Leandro, L. Pasquale, S. Peralta, M. T. Viggiani, C. Severi, B. Annibale, R. Cuomo. Italian guidelines for the diagnosis and management of colonic diverticulosis and diverticular disease. *Digestive and Liver Disease* 56 (2024) 1989–2003
6. F. Pandico, S. Cammarota, A. Citarella, F. F. Bernardi, M. Cozzolino, F. De Rosa, M. Di Gennaro, M. Fogliasecca, R. Giordana, A. Russo, V. Salerno, L. Scafa, U. Trama - Analisi real word sull'utilizzo di rifaximina 200 mg nella Regione Campania. *Recenti Prog Med* 2023;114(5):284-289 doi 10.1701/4032.40077