


UTILIZZO TERRITORIALE DI EBPM e FONDAPARINUX nel **TRATTAMENTO** del

U.O.C. Farmacia/Appropriatezza prescrittiva

U.O.S.D. Angiologia SE

TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV) *(indicazioni mediche)*



FARMACO	INDICAZIONE TERAPEUTICA DA RCP	POSOLOGIA	DURATA DELLA TERAPIA	MODALITA' DISTRIBUTIVA
ENOXAPARINA	Trattamento TEV ad esclusione dell'EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica.	100 U.I./kg/ 2 die	10 giorni	CONVENZIONATA
	Trattamento prolungato TEV e prevenzione delle recidive in pazienti adulti con neoplasia attiva .	100 U.I./kg/ 2 die per i primi 5-10 giorni seguiti da 150 U.I./kg/ 1 die	6 mesi*	
NADROPARINA	Trattamento TEV	92,7 U.I./kg./2 die	10 giorni	CONVENZIONATA
PARNAPARINA	Trattamento TEV	6.400 U.I./2 die	10 giorni	CONVENZIONATA
TINZAPARINA	Trattamento TEV	175 U.I./kg/1 die	6 giorni	CANALE DPC
	Trattamento prolungato TEV e prevenzione delle recidive in pazienti adulti con neoplasia attiva .	175 U.I./kg/1 die	6 mesi*	
FONDAPARINUX	Trattamento TEV	7,5 mg/1 die	5-10 giorni	CANALE DPC
	Trattamento TVS (trombosi venosa superficiale) sintomatica spontanea acuta degli arti inferiori in assenza di TVP concomitante	2,5 mg/1 die	45 giorni	

Per approfondimenti si rimanda all'RCP dei farmaci.

CHI PUO' PRESCRIVERE?

- ✓ MMG
- ✓ MEDICI SPECIALISTI

*Dopo 6 mesi rivalutazione dello specialista.