

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

Id	Quesito	Risp_esatta	Risp_errata_1	Risp_errata_2	Risp_errata_3	Materia
1	Cos'è la compromissione della mobilità?	La compromissione della mobilità è una diagnosi infermieristica	La compromissione della mobilità è un problema collaborativo	La compromissione della mobilità è una complicanza clinica	La compromissione della mobilità è una diagnosi riabilitativa	INFERMIERISTICA GENERALE
2	NANDA accetta proposte per nuove diagnosi, da quale dei seguenti soggetti?	Qualsiasi infermiere interessato	Organizzazione mondiale della sanità	Esperti di riconosciuto valore	Ordini infermieristici	INFERMIERISTICA GENERALE
3	In cosa consiste la consegna infermieristica?	Una sorta di diario di reparto su cui è riportato tutto ciò che attiene alla vita del reparto stesso	Una relazione sul lavoro del caposala	Una tabella per segnare le ore di straordinario	Una scheda contenente il nome dei farmaci da somministrare	INFERMIERISTICA GENERALE
4	Secondo NANDA, quali sono gli elementi di una diagnosi infermieristica reale:	Titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati	Titolo, definizione, caratteristiche definenti, eziologia	Titolo, definizione, sintomi, fattori correlati	Categoria, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati	INFERMIERISTICA GENERALE
5	Per quanto tempo la cartella clinica viene conservata:	per tempo illimitato	per dieci anni	fino alla morte del paziente	per cinque anni dopo la dimissione o il decesso	INFERMIERISTICA GENERALE
6	L'assistenza infermieristica si realizza attraverso quale tipi di intervento:	specialistico, autonomi e complementari, di natura tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativi	interventi pratici, soprattutto di somministrazione farmaci	interventi di assistenza tecnica e relazionale del paziente mai autonomi	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
7	Cos'è l'assistenza infermieristica o nursing:	è una disciplina che consiste essenzialmente nell'assistere e prendersi cura degli individui, delle famiglie e delle comunità per ottenere, riottenere e mantenere lo stato di salute	è caratterizzata prettamente dall'assistenza del malato in ospedale	non interessa la comunità ma il singolo individuo	non è regolata da un codice etico	INFERMIERISTICA GENERALE
8	Qual è il modello concettuale di salute che rende più evidente la specificità della professione infermieristica:	il modello bio-psico-sociale	il modello bio-organicistico	il modello psico-sociale	il modello biologico	INFERMIERISTICA GENERALE
9	Cosa si intende per procedura:	una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri standard	una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri induttivi	una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri prestabiliti di appropriatezza ed efficacia	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
10	Come è denominato il costrutto teorico di nursing transculturale elaborato da Purnell e Paulanka:	modello della competenza culturale	modello della salute-malattia	modello della diversità	modello globalizzato	INFERMIERISTICA GENERALE
11	Il protocollo infermieristico ha la funzione di:	uniformare i diversi comportamenti infermieristici	informare il paziente circa le prestazioni che l'équipe assistenziale è in grado di offrire	definire in collaborazione con il caposala/coordinatore le attività del reparto	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
12	Nel modello concettuale elaborato da Calista Roy, come sono definiti gli agenti di stress:	stimoli ambientali che richiedono una risposta adattiva	reazioni essenzialmente patologiche alle sollecitazioni ambientali	azioni in grado di scatenare reazioni abnormi	stimoli abnormi in risposta a situazioni problematiche	INFERMIERISTICA GENERALE
13	Secondo le ipotesi teoriche di F. Nightingale, il concetto di ambiente è:	essenzialmente fisico	essenzialmente psico-sociale	inteso in senso globale	essenzialmente sociale	INFERMIERISTICA GENERALE
14	Si può parlare di ambito disciplinare un insieme di conoscenze che ha almeno:	un proprio oggetto di studio, uno scopo e un metodo	strumenti disciplinari e non disciplinari	una tradizione culturale	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
15	La prima azione della cosiddetta catena della sopravvivenza prevede:	la chiamata del 118	l'applicazione della ventilazione artificiale	l'uso del defibrillatore	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
16	Da chi è stato introdotto l'approccio interpretativo fenomenologico nel nursing:	M. Rogers	M. Leininger	F. G. Abdellah	V. Henderson	INFERMIERISTICA GENERALE
17	Cosa rappresenta il piano di assistenza infermieristica:	rappresenta un metodo idoneo per comunicare e organizzare l'assistenza	rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento assistenziale	è la rappresentazione grafica del metodo di lavoro adottato all'interno di un'équipe assistenziale	rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento delle professioni sanitarie	INFERMIERISTICA GENERALE
18	Com'è denominato il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linea di attività:	modello tecnico o per compiti	modello per piccole équipe	modello primary care	modello personalizzato di cure	INFERMIERISTICA GENERALE
19	Da chi è stato elaborato il concetto di self care:	Dorothea Orem	Nathan Roper	Maria Montessori	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
20	Qual è l'obiettivo della terapia palliativa:	il miglioramento della qualità della vita	la guarigione clinica del paziente	la possibilità di evitare una terapia chirurgica	la riduzione delle dimensioni del tumore	INFERMIERISTICA GENERALE
21	Quali sono le dimensioni della salute:	fisica, psichica, emotiva, relazionale, spirituale, sociale	fisica, psichica, emotiva, relazionale, spirituale, territoriale	fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, sociale	fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, economica	INFERMIERISTICA GENERALE
22	Cosa NON includono i modelli funzionali (fisiologici) specificati da Gordon:	la prevenzione dei rischi	l'attività ed esercizio fisico	la sessualità e riproduzione	il riposo e sonno	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

23	Il testo teorico di maggior rilievo di Virginia Henderson è:	The Principles and Practice of Nursing	The Foundations of Nursing	Nursing: a general Theory	Theory and Practice of Nursing	INFERMIERISTICA GENERALE
24	Cosa definisce il concetto di empowerment:	un processo intenzionale orientato allo sviluppo della capacità dei membri di risolvere i problemi in modo adeguato, utilizzando specifiche competenze	la mobilitazione delle risorse a disposizione degli individui in relazione ai diversi carichi di lavoro	l'azione di un gruppo di lavoro che deve migliorare il sistema di qualità aziendale	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
25	Quali sono le fasi essenziali del nursing secondo le ipotesi teoriche di Peplau:	orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione	raccolta dati, identificazione, formulazione degli obiettivi, valutazione	orientamento e definizione del campo problematico	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
26	Quale filosofa del nursing definisce il bisogno come «una qualsiasi esigenza da parte della persona ammalata che può essere soddisfatta da un infermiere professionale»?	J. Travelbee	D. Orem	J. Watson	E. Adam	INFERMIERISTICA GENERALE
27	La NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) come definisce le diagnosi infermieristiche:	un giudizio clinico sulle risposte di un individuo, di una famiglia o di una comunità a processi di salute/vita reali o potenziali	un obiettivo infermieristico	una singola definizione concettuale come obesità o malnutrizione	un sintomo come, per esempio, il vomito	INFERMIERISTICA GENERALE
28	Qual è la sequenza corretta del processo di assistenza:	accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione	diagnosi, accertamento, attuazione, pianificazione, valutazione	accertamento, pianificazione, diagnosi, attuazione, valutazione	accertamento, valutazione, diagnosi, pianificazione, attuazione	INFERMIERISTICA GENERALE
29	La celebrazione della giornata dell'infermiere cade ogni anno il 12 maggio, perché:	è nata Florence Nightingale	è nata Virginia Henderson	è stata istituita la prima scuola per infermiere in Gran Bretagna	è stato fondato il consiglio nazionale delle infermiere (ICN)	INFERMIERISTICA GENERALE
30	Qual è la differenza fra segno e sintomo?	Il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva	Si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno	Il sintomo segue sempre il segno	Il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna dell'organismo	INFERMIERISTICA GENERALE
31	Secondo Carpenito gli infermieri hanno la responsabilità di trattare:	diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi	interventi clinici e diagnostici secondo prescrizione medica	interventi di infermieristica avanzata	diagnosi infermieristiche e prescrizioni mediche	INFERMIERISTICA GENERALE
32	La Carta di Ottawa definisce i parametri del concetto di salute con riferimento a:	aspirazioni, bisogni, modificazione dell'ambiente o adattamento ad esso	esitamento e riduzione dei danni e delle patologie	interventi di infermieristica avanzata	concetto di salute, concetto di malattia, concetto di intervento sanitario	INFERMIERISTICA GENERALE
33	Chi è l'infermiere:	il professionista responsabile dell'assistenza infermieristica	la persona che fa da tramite tra il paziente e il medico	colui che dipende in ogni sua azione dal medico	colui che mette in pratica le terapie prescritte dal medico	INFERMIERISTICA GENERALE
34	Qual è il ruolo dell'infermiere:	assistere l'ammalato ma anche supportare emotivamente i suoi familiari	partecipare all'assistenza del paziente eseguendo solo istruzioni mediche	assistere l'ammalato prescindendo dai suoi familiari	assistere solo ed esclusivamente il paziente accentrando tutta la sua attenzione su di lui	INFERMIERISTICA GENERALE
35	Cos'è la cartella infermieristica:	è uno strumento di supporto cartaceo e/o informatico atto a contenere la registrazione dei dati e l'insieme dei documenti di pertinenza	è compilata solo ed esclusivamente dal medico di turno	nessuna delle altre risposte è corretta	non è considerata un documento valido per una buona pratica infermieristica	INFERMIERISTICA GENERALE
36	Qual è il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio nelle strutture sanitarie:	il metodo MAPO	la misura dinamometrica	la valutazione del numero dei posti letto	il metodo NIOSH	INFERMIERISTICA GENERALE
37	Indicare la finalità del triage all'ingresso in pronto soccorso:	l'agevolazione dell'accesso alle cure non sulla base dell'ordine di arrivo ma della gravità delle condizioni	la compilazione della cartella clinica	nessuna delle altre risposte è corretta	l'assegnazione ad ogni paziente di un numero che definisca l'ordine di arrivo	INFERMIERISTICA GENERALE
38	La teoria di Madeleine Leininger tratta i problemi dell'infermieristica rivolti:	alla multiculturalità e transculturalità	all'ambiente e relazione	all'adattamento e consapevolezza	al self-care	INFERMIERISTICA GENERALE
39	Cosa implica la nozione di pianificazione assistenziale:	l'acquisizione di dati, la previsione delle condizioni future, la definizione degli obiettivi	esclusivamente la previsione delle condizioni future	nessuna delle altre risposte è corretta	l'acquisizione delle caratteristiche strutturali dell'azienda presa in esame, la conoscenza delle condizioni di budget attuali e la definizione degli obiettivi	INFERMIERISTICA GENERALE
40	La teoria dei bisogni, nelle discipline infermieristiche, è un modello teorico elaborato da:	V. Henderson	A. Maslow	J. Travelbee	D. Snell	INFERMIERISTICA GENERALE
41	Cosa si intende per profilo di cura:	un piano di cura interdisciplinare creato per rispondere ai problemi diagnostici e clinici di gruppi di pazienti	la continuità assistenziale tra strutture ospedaliere e strutture territoriali	il piano di cura proposto dal medico di base	un piano di cura creato per rispondere al profilo psicologico di gruppi di pazienti	INFERMIERISTICA GENERALE
42	Cosa implica il concetto di sviluppo sostenibile:	uno sviluppo economico compatibile con il complesso degli ecosistemi, in regime di equilibrio ambientale	un'iniziativa legislativa circa un progetto ambientale sviluppato in linea con le normative nazionali	nessuna delle altre risposte è corretta	il rapporto genericamente positivo tra progetti umani e ambiente fisico	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

43	La prospettiva emic nel nursing transculturale indica il:	punto di vista folk o popolare	punto di vista appreso e trasmesso a livello formale	rapporto supportivo che intercorre tra due persone, infermiere e utente, che ricoprono ruoli paritetici	processo del prendersi cura	INFERMIERISTICA GENERALE
44	Con l'espressione "Evidence Based Nursing" cosa si intende:	l'uso, nella pratica infermieristica, di verifiche empiriche in associazione con diagnosi cliniche	l'accentuazione delle problematiche socio-sanitarie in contesti politico-istituzionali	nessuna delle altre risposte è corretta	l'uso, nella pratica infermieristica, di modelli logici e procedure deduttive	INFERMIERISTICA GENERALE
45	Non è un sistema di classificazione dell'assistenza infermieristica:	il DRG	il NOC	il NANDA	il NIC	INFERMIERISTICA GENERALE
46	Quando un bisogno diventa una richiesta sanitaria?	Quando un individuo, sano o malato, si rivolge alla struttura sanitaria	Quando un individuo non presenta alcun problema medico	Nessuna delle altre risposte è corretta	Quando un individuo prenota un check-up completo	INFERMIERISTICA GENERALE
47	I piani assistenziali standardizzati cosa contengono:	linee guida che indicano l'assistenza da erogare in situazioni tipiche	standard di procedure organizzative di specifiche unità assistenziali	problemi ed obiettivi personalizzati	problemi, obiettivi ed interventi personalizzati di assistenza infermieristica	INFERMIERISTICA GENERALE
48	Un gruppo di pazienti, il cui il lavoro è basato sulla pianificazione e l'integrazione, prende il nome di:	modello per piccole équipe	modello primary care	modello dell'équipe multidisciplinare	modello tecnico o per compiti	INFERMIERISTICA GENERALE
49	Cos'è l'unità del malato?	Lo spazio e gli accessori dati in uso al paziente durante la sua degenza	La terapia e la diagnosi	Il materiale necessario per la terapia durante la degenza	L'équipe medica e infermieristica addetta alla sua degenza	INFERMIERISTICA GENERALE
50	La legge n. 42 del 1999 sostituì la denominazione professione sanitaria ausiliaria in:	professione sanitaria	professione ausiliaria	lavoratore in campo sanitario	lavoratore sanitario	INFERMIERISTICA GENERALE
51	Quale provvedimento ha istituito la qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario?	Il d.lgs. 229/1999	La legge 261/2002	La legge 261/2000	La legge 271/2000	INFERMIERISTICA GENERALE
52	L'infermiere è tenuto a mantenere il segreto professionale, in quali casi:	sia per obbligo giuridico che come espressione del rapporto di fiducia creatosi con il paziente	può agire come meglio crede senza particolari obblighi	solo per obblighi giuridici	per acquisire la fiducia del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
53	Il principio fondamentale della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari è:	il potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati	nessuna delle altre risposte è corretta	l'agevolazione concessa ad utenti bisognosi circa l'utilizzo dei servizi sanitari pubblici	il rispetto del dettato costituzionale in materia socio-sanitaria	INFERMIERISTICA GENERALE
54	Il modello funzionale di salute identificato da M. Gordon è rappresentato:	dall'attività ed esercizio	dai sistemi corporei	dall'autorealizzazione	dalla continuità assistenziale	INFERMIERISTICA GENERALE
55	Cosa si intende per accreditamento professionale:	costituisce un sistema standardizzato di valutazione della qualità delle prestazioni professionali in strutture private	può contribuire a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate	definisce i prerequisiti di una struttura privata ai fini di ottenere la possibilità di erogare servizi pubblici	corrisponde alla verifica periodica dei requisiti funzionali minimi di una struttura socio-sanitaria	INFERMIERISTICA GENERALE
56	Il processo di nursing è definibile come:	un metodo d'identificazione e di soluzione dei problemi infermieristici	nessuna delle altre risposte è corretta	un metodo d'identificazione degli interventi più appropriati	un processo dinamico di individuazione delle aree di competenza del nursing	INFERMIERISTICA GENERALE
57	Per ospedalizzazione domiciliare si intende:	una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero	una forma di preospedalizzazione	il confino di un paziente affetto da una malattia infettiva contagiosa	l'assistenza domiciliare prestata a pazienti affetti da malattie	INFERMIERISTICA GENERALE
58	L'ambiente in cui si svolge l'interazione infermiere/paziente si definisce terapeutico quando:	il modello organizzativo dell'assistenza è basato sulla multidisciplinarietà	il modello organizzativo dell'assistenza è basato sul riduzionismo teorico di alcune discipline rispetto ad altre	sussiste una netta divisione dei compiti all'interno dell'équipe assistenziale	prevale una concezione organicistica della salute dell'uomo	INFERMIERISTICA GENERALE
59	Le tecniche ergonomiche si occupano di:	definire le condizioni migliori affinché il lavoro possa adattarsi all'uomo	nessuna delle altre risposte è corretta	legiferare in materia di prevenzione sugli infortuni del lavoro	ottimizzare le performance in lavori che implicano l'utilizzo di macchinari complessi	INFERMIERISTICA GENERALE
60	Il sistema di sorveglianza delle infezioni ospedaliere risulta efficace quando:	è continuativo e si basa sulla raccolta dei dati di laboratorio, sulle notifiche dei casi da parte dei medici delle unità operative e sulla raccolta dei dati effettuati	nessuna delle altre risposte è corretta	si basa sulla raccolta di dati microbiologici derivati dall'effettuazione di analisi sui campioni biologici dei pazienti ritenuti infetti	non è continuativo ma implica frequenti controlli a campione	INFERMIERISTICA GENERALE
61	Di cosa si occupa la semeiotica:	dello studio dei sintomi di una determinata patologia	nessuna delle altre risposte è corretta	dell'individuazione delle specie dei semi	dello studio dei processi culturali di significazione in genere	INFERMIERISTICA GENERALE
62	Fabbisogno di personale di assistenza. Qual è uno degli indici per calcolarlo adeguatamente:	il PRN	il PCA	il PDCA	il metodo inglese	INFERMIERISTICA GENERALE
63	Nella sperimentazione clinica, viene definito gruppo di controllo il gruppo:	di pazienti che non ricevono il trattamento oggetto di sperimentazione	nessuna delle altre risposte è corretta	di pazienti oggetto effettivo di sperimentazione	del campione complessivo di riferimento	INFERMIERISTICA GENERALE
64	Indicare quale tra le seguenti è una fonte autorevole di revisioni sistematiche della letteratura biomedica:	Cochrane Library	Elsevier	C.I.N.A.H.L.	Google	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

65	Nel modello di quale tra le seguenti studiose la cura di sé è interpretata come essenziale bisogno umano?	D. Orem	E. Adam	J. Watson	E. Wiedenbach	INFERMIERISTICA GENERALE
66	Il personale obiettore può rifiutarsi di prestare assistenza antecedente o conseguente all'intervento diretto, che determina l'interruzione della gravidanza alle donne che abortiscono?	No	Solo se qualcun altro può prestare assistenza al posto loro	Solo in alcune Regioni	In alcuni casi	INFERMIERISTICA GENERALE
67	Quale attività non è di competenza dell'operatore professionale coordinatore?	Delegare ad esterni l'attività didattica e di formazione	Partecipare ad eventuali commissioni per l'acquisto di materiali ed attrezzature	Esercitare funzioni di controllo e supervisione	Coordinare l'attività del personale	INFERMIERISTICA GENERALE
68	I crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) sono stati imposti:	a tutti gli operatori dipendenti o liberi professionisti, operanti sia nella sanità pubblica che in quella privata	solo ai liberi professionisti	solo agli operatori che operano nella sanità privata	solo agli operatori sanitari che operano nella sanità pubblica	INFERMIERISTICA GENERALE
69	Il NIC (Nursing Interventions Classification) riporta esclusivamente interventi infermieristici:	nessuna delle altre risposte è corretta	generalistici	specialistici	collaborativi	INFERMIERISTICA GENERALE
70	La diagnosi infermieristica:	indirizza gli interventi volti a conseguire dei risultati di cui è responsabile l'infermiere	non può mai costituire un giudizio clinico	è sinonimo di diagnosi medica	non esiste	INFERMIERISTICA GENERALE
71	Nightingale istituì le prime scuole per infermiere allo scopo di:	tutte le altre risposte sono corrette	innalzare lo status sociale dell'infermiere	attrezzare le infermiere con competenze specifiche	preparare infermiere-insegnanti per le allieve infermiere	INFERMIERISTICA GENERALE
72	Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera:	la scala di Conley	la scala di Likert	la scala di Cheops	la scala ADL di Katz	INFERMIERISTICA GENERALE
73	Indicare quale tra i seguenti principi non è contemplato nell'atto costitutivo dell'OMS:	nessuna delle altre risposte è corretta	la salute dei popoli	il pericolo delle condizioni di ineguaglianza tra i diversi paesi	l'ammissione di tutti i popoli ai benefici delle conoscenze acquisite dalla ricerca scientifica	INFERMIERISTICA GENERALE
74	Quale delle seguenti funzioni non appartiene al coordinatore professionale sanitario esperto?	Pulizia e riordino degli ambienti	Analisi del sistema organizzativo	Gestione delle dinamiche e delle motivazioni al lavoro	Esercizio della leadership	INFERMIERISTICA GENERALE
75	Secondo l'approccio per attributi di Greenwood, quale tra i seguenti non è un carattere distintivo di una professione?	L'orientamento teorico del professionista	La cultura professionale	La sanzione della comunità	L'autorità professionale	INFERMIERISTICA GENERALE
76	Il Center for Disease Control di Atlanta, nel 2007, ha identificato delle linee guida per l'isolamento in ospedale prevedendo due livelli di intervento. Quali fra le seguenti non sono precauzioni raccomandate in tale sede?	Precauzioni generiche	Precauzioni per malattie a trasmissione aerea	Precauzioni per malattie a trasmissione attraverso droplet	Precauzioni per malattie trasmissibili attraverso il contatto	INFERMIERISTICA GENERALE
77	Il Daily Routine Work è un metodo di miglioramento della qualità:	per l'outcome	per gli esiti	per obiettivi	per la struttura	INFERMIERISTICA GENERALE
78	Da chi è stato elaborato il modello della salute come espansione della coscienza:	M. A. Newman	C. Roy	E. Wiedenbach	N. Roper	INFERMIERISTICA GENERALE
79	L'infermieristica secondo alcune classificazioni è considerata una scienza:	prescrittiva	normativa	ecologica	descrittiva	INFERMIERISTICA GENERALE
80	Indicare quale delle seguenti azioni non fa parte delle fasi del processo di assistenza infermieristica:	prevenzione dei rischi	accertamento e diagnosi	identificazione degli obiettivi	pianificazione e attuazione	INFERMIERISTICA GENERALE
81	Il concetto di area critica implica:	una struttura complessivamente ritenuta idonea a fornire assistenza ottimale al paziente critico	mezzi ed ambiente adatti all'assistenza di un paziente in condizioni gravi	zona sorvegliata in cui può accedere solo personale autorizzato	un reparto dotato di attrezzature di terapia intensiva	INFERMIERISTICA GENERALE
82	L'ambiente in cui si svolge l'interazione infermiere/paziente si definisce terapeutico quando:	propone un modello di assistenza basato su approcci multidisciplinari	sussiste una netta divisione dei compiti all'interno dell'équipe assistenziale	emerge la componente tecnica della professione infermieristica	prevale una concezione organicistica della salute dell'uomo	INFERMIERISTICA GENERALE
83	Come è definibile la sorveglianza sanitaria:	attività di prevenzione basata sul controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischio, al fine di proteggere la loro salute e prevenire malattie professionali e correlate al lavoro	misura di controllo delle acque di balneazione	misura di restrizione applicata ai contatti sani di un caso contagioso	misura di controllo degli animali da macello	INFERMIERISTICA GENERALE
84	Nell'ambito della formazione, le competenze chiave del professionista vengono anche definite:	competenze trasversali	competenze di base	competenze esperte	competenze avanzate	INFERMIERISTICA GENERALE
85	Come vengono definiti in medicina gli acufeni?	percezioni di fenomeni sonori nonostante l'assenza di stimolazione fisiologica dei recettori cocleari	mancata percezione dei suoni esterni	vertigini adolescenziali	formazioni delle cupole ampollari	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

86	Quale patologia ha come sintomo caratteristico la diarrea ad acqua di riso?	Colera	Salmonella	Infezione da HSV	Infezione da micobatteri atipici	INFERMIERISTICA GENERALE
87	Qual è la principale caratteristica delle ustioni di secondo grado:	flittene	infezione virale	escara molle	diminuzione di tessuto necrotico	INFERMIERISTICA GENERALE
88	La peculiarità della tossina botulinica, è:	Penetra attraverso la barriera ematoencefalica	Viene inattivata a 37 C° per 5 minuti	Inibisce la divisione cellulare	Viene prodotta dai germi comuni	INFERMIERISTICA GENERALE
89	In quali casi definiamo la febbre come febbre intermittente:	la temperatura presenta dei rialzi improvvisi, separati da periodi in cui i valori sono nella norma	la temperatura rimane elevata con variazioni di un grado	la temperatura si mantiene per breve tempo a 38 °C	si alternano periodi in cui la temperatura si eleva gradualmente a periodi di stabile ipertermia	INFERMIERISTICA GENERALE
90	Quale occlusione intestinale non è uno strangolamento:	l'ileo biliare	il volvolo del tenue	l'ernia strozzata	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
91	La definizione di pneumoconiosi è:	malattia professionale polmonare	broncopneumopatia maligna ostruttiva	broncopneumopatia cronica	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
92	Il vaccino antitetanico è formato da:	anatossina	batteri vivi attenuati	batteri uccisi al calore	batteri vivi	INFERMIERISTICA GENERALE
93	Cos'è il botulismo?	Un'intossicazione alimentare	Un'epatite alcolica	Un avvelenamento da funghi	Un'infezione a trasmissione aerea	INFERMIERISTICA GENERALE
94	La principale modalità di trasmissione del virus dell'epatite E è:	oro-fecale	transplacentale	via respiratoria	attraverso morsi di animali	INFERMIERISTICA GENERALE
95	Le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni:	standard e aggiuntive	universali	per i liquidi biologici infetti	per i liquidi biologici in persone con HIV positivo	INFERMIERISTICA GENERALE
96	Quale tra le seguenti sostanze ha azione irritante sull'apparato broncopolmonare:	acido solforico	rame	ferro	lattice	INFERMIERISTICA GENERALE
97	L'emottisi è:	emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie	emissione di sangue dall'apparato urinario	emissione di sangue con le feci	emissione di sangue proveniente dalle vie digestive	INFERMIERISTICA GENERALE
98	L'origine dell'encefalomielite acuta disseminata è:	virale	batterica	parassitaria	eziologia non infettiva	INFERMIERISTICA GENERALE
99	Si definisce dismorfofobia la paura di:	deformazioni corporee	malattie	buio	colori	INFERMIERISTICA GENERALE
100	Quale patologia è caratterizzata dalla sindrome del dito bianco?	vibrazioni	tunnel carpale	idrargirismo	avvelenamento da solventi organici	INFERMIERISTICA GENERALE
101	La Toxoplasmosi è una patologia che si trasmette tramite le feci di quale dei seguenti animali:	gatto	galline	canarino	roditori	INFERMIERISTICA GENERALE
102	Si definisce sincope:	una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza	un sintomo dell'epilessia	un sinonimo di ipotermia	una perdita di coscienza irreversibile	INFERMIERISTICA GENERALE
103	Le emorroidi di terzo grado sono caratterizzate da:	protrusione con il ponzamento che si riduce manualmente	protrusione nella defecazione che si riduce spontaneamente	sanguinamenti	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
104	La Salmonella typhi nel primo settenario di malattia può essere isolata da:	sangue	liquor	urine	muco	INFERMIERISTICA GENERALE
105	Con la colorazione di Ziehl-Neelsen al microscopio osserviamo:	il bacillo della tubercolosi	Stafilococchi	Neisserie	Streptococchi	INFERMIERISTICA GENERALE
106	Le macchie di Janeway sono tipiche di:	endocardite infettiva	tifo	rosolia	vaiolo	INFERMIERISTICA GENERALE
107	Quale è l'obiettivo della terapia HAART?	Bloccare la replicazione virale	Prevenire l'infezione nel soggetto esposto	Vaccinare il soggetto non esposto	Prevenire le infezioni opportunistiche AIDS correlate	INFERMIERISTICA GENERALE
108	Che tipo di complicanza è più frequente nel morbillo?	Broncopolmonite	Epatite	Epilessia	Nefriti interstiziali	INFERMIERISTICA GENERALE
109	Quale mitto di urina bisogna prendere per eseguire un'analisi batteriologica?	Il mitto intermedio	Il mitto iniziale	Il mitto terminale	Il mitto intermedio e quello terminale	INFERMIERISTICA GENERALE
110	L'adrenalina viene usata in quale caso:	fibrillazione ventricolare	tachicardia	angina pectoris	blocco atrio-ventricolare	INFERMIERISTICA GENERALE
111	Perché prima di eseguire una venipuntura si aspira il sangue?	Per essere sicuri di avere inserito l'ago in vena	Per ridurre il rischio di complicanze	Per operare un lavaggio fisiologico della siringa	Per ridurre le complicanze infettive	INFERMIERISTICA GENERALE
112	La scala di Maslow serve per capire:	le necessità e i bisogni dell'uomo	il rischio radioattivo	lo stato di coma	lo stato di idratazione	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

113	A quale anno risale l’emanazione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro?	2008	2010	2012	2014	INFERMIERISTICA GENERALE
114	In caso di intervento chirurgico ai polmoni cosa bisogna fare:	effettuare ginnastica respiratoria	somministrare i farmaci preanestetici	controllare la zona interessata	preparare il tavolo operatorio	INFERMIERISTICA GENERALE
115	Quale procedura è indispensabile per eseguire un cateterismo vescicale?	Disinfezione del meato uretrale esterno	Porre il paziente in decubito prono	Puntura sovrapubica	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
116	In che anno Fleming scoprì la penicillina?	1929	1937	1945	1925	INFERMIERISTICA GENERALE
117	La talassemia è trasmessa con meccanismo:	autosomico recessivo	legato al cromosoma X	legato al cromosoma Y	autosomico codominante	INFERMIERISTICA GENERALE
118	Il flebopatico peggiora generalmente in quale stagione:	estate	autunno	inverno	non risente di variazioni stagionali	INFERMIERISTICA GENERALE
119	Quale dei seguenti fattori svolge un ruolo determinante nella formazione delle piaghe da decubito?	Perdita della sensibilità dolorifica	Stato settico	Ipossia locale per fenomeni vasospastici	Umidificazione dei tessuti cutanei	INFERMIERISTICA GENERALE
120	Quale dei seguenti fattori è coinvolto nella cardiomiopatia congestizia?	Alcool	Dieta ipoproteica	Obesità	Ipercolesterolemia	INFERMIERISTICA GENERALE
121	Il segno più affidabile di una trombosi profonda è:	edema distale dell’arto	senso di peso e di tensione	dilatazione delle vene superficiali	rossore e infiammazione del tessuto sottocutaneo	INFERMIERISTICA GENERALE
122	Quale fra le seguenti malattie del connettivo presenta con maggior frequenza un interessamento dell’esofago?	Sclerodermia	Dermatomiosite	Artrite reumatoide	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
123	Nell’endocardite infettiva dell’esame del sedimento urinario mostra pressoché costantemente:	microematuria	cilindruria	cristalluria (ossalati e urati)	tappeto di cellule delle basse vie urinarie morfologicamente alterate	INFERMIERISTICA GENERALE
124	Un paziente di 60 anni presenta da tempo tosse stizzosa e febbre irregolare. Il primo esame da richiedere ai fini della diagnosi è:	Rx torace	esame citologico dell’espettorato	Tine Test	broncoscopia	INFERMIERISTICA GENERALE
125	La valutazione definitiva dell’arresto cardiaco si fa attraverso:	l’ECG	il riscontro di assenza del polso periferico	il riscontro della scomparsa della pressione sanguigna	il riscontro di assenza di respiro spontaneo	INFERMIERISTICA GENERALE
126	In quale di queste condizioni si rileva di solito tremore a riposo, bradicinesia e rigidità muscolare?	Morbo di Parkinson	Morbo di Sture-Weber	Sclerosi laterale amiotrofica	Siringomielia	INFERMIERISTICA GENERALE
127	La sede più comune negli arti inferiori in cui un embolo si arresta è:	femorale comune	femorale profonda	poplitea	tibiale anteriore	INFERMIERISTICA GENERALE
128	La definizione di focolaio epidemico si differenzia da quella classica di epidemia per il fatto che:	l’epidemia si è sviluppata improvvisamente in un contesto spaziale limitato	si sono manifestati solo uno o pochi casi di malattia in una popolazione nella quale tale patologia è normalmente assente	un agente patogeno persiste in una determinata popolazione causando un numero di casi di malattia che tende a mantenersi stabile nel tempo	l’epidemia si diffonde attraverso i continenti	INFERMIERISTICA GENERALE
129	Quale tra i seguenti sintomi non precede la crisi ipoglicemica?	Poliuria	Cefalea	Sudorazione	Tachicardia	INFERMIERISTICA GENERALE
130	Cosa indica la poichilocitosi:	la presenza di eritrociti di forme diverse	la presenza di eritrociti di dimensioni diverse	una particolare forma di leucocitosi	la presenza di eritrociti con diversa concentrazione di emoglobina	INFERMIERISTICA GENERALE
131	Quale delle seguenti malattie si può trasmettere per via aerea?	Parotite	Mononucleosi	Meningite cerebrospinale epidemica	Tutte le altre risposte sono corrette	INFERMIERISTICA GENERALE
132	Quale delle seguenti sostanze può determinare neuropatie?	Mercurio	Lattice	Cadmio	Talco	INFERMIERISTICA GENERALE
133	La frattura di Colles è localizzata a livello di quale parte de corpo:	estremità distale del radio	estremità prossimale del femore	piede	bacino	INFERMIERISTICA GENERALE
134	Che cosa si intende per acalasia:	assenza di peristalsi esofagea	contrazioni non peristaltiche con periodi di peristalsi normale	peristalsi normale con onde di ampiezza elevata	turbe aspecifiche della malattia esofagea	INFERMIERISTICA GENERALE
135	Per un paziente in stato di shock ipovolemico è indicata una terapia:	infusionale-trasfusionale	antiaritmica	antiipertensiva	con alfamimetici	INFERMIERISTICA GENERALE
136	Le proteine G sono:	parte del sistema di trasduzione del segnale	canali ionici	presenti nel nucleo cellulare	proteine del plasma	INFERMIERISTICA GENERALE
137	In quale caso, tra i seguenti, un infermiere è tenuto ad effettuare un lavaggio antisettico delle mani?	Prima e dopo procedure invasive come l’inserzione di un catetere venoso	Prima del contatto diretto con un paziente	Dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano	Prima di una qualsiasi procedura	INFERMIERISTICA GENERALE
138	Si definisce zoonosi una malattia che:	si trasmette dagli animali all’uomo	si trasmette per via aerea	è infettiva ed è trasmessa da uomo malato a uomo sano	si manifesta solo nell’uomo	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

139	La patologia definita cataratta dei vetrai è causata da:	radiazioni infrarosse emesse dal vetro incandescente	radiazioni X emesse dai metalli nel vetro	nessuna delle altre risposte è corretta	polvere di vetro in sospensione nell'aria	INFERMIERISTICA GENERALE
140	Qual è la definizione della malattia di Becker?	Distrofia muscolare progressiva	Mucopolisaccaridosi	Gangliosidosi	Calcolosi delle vie biliari	INFERMIERISTICA GENERALE
141	In quale delle seguenti condizioni si realizza la fonazione?	C'è coordinazione tra apparato respiratorio e fonatorio	Il flusso inspiratorio è diminuito	Nessuna delle altre risposte è corretta	Le corde vocali sono intatte	INFERMIERISTICA GENERALE
142	Si parla di malattia da ustione quando la parte ustionata supera il:	20% nell'adulto e 10-12% nel bambino	ogni volta che sia presente un'ustione indipendentemente dal grado	50% nel bambino e 60% nell'adulto	50% nell'adulto e 30% nel bambino	INFERMIERISTICA GENERALE
143	Cosa si intende per tossinfezione alimentare:	una serie di sintomi causati dall'ingestione di cibi contaminati da sostanze tossiche o da microrganismi patogeni	una serie di sintomi causati dall'ingestione di cibi scaduti	un'intolleranza verso il latte	un'infezione causata da spore contenute negli alimenti	INFERMIERISTICA GENERALE
144	La via di trasmissione preferenziale per l'infezione da HIV è:	la via sessuale	la via oro-fecale	tutte le altre risposte sono corrette	la via materno-fetale	INFERMIERISTICA GENERALE
145	In Italia, le principali cause di morte in ordine decrescente sono:	malattie cardiovascolari, tumori, malattie infettive	tumore al seno, malattie cardiovascolari, nefropatie	malattie cardiovascolari, tumore della cervice uterina, malattie infettive	malattie infettive, infezioni nosocomiali, tumori, malattie cardiovascolari	INFERMIERISTICA GENERALE
146	Le neoplasie sono causate anche dalle radiazioni ionizzanti perché:	inducono mutazioni in macromolecole informazionali (DNA, RNA, proteine)	provocano apoptosi cellulare	provocano lesioni della cute	indeboliscono l'immunità innata e acquisita	INFERMIERISTICA GENERALE
147	Le epilessie sono malattie contraddistinte da:	accessi parossistici ricorrenti	perdita di coscienza	ritardo mentale	lenta insorgenza di deficit neurologici irreversibili	INFERMIERISTICA GENERALE
148	La listeriosi è una malattia infettiva che generalmente si trasmette attraverso:	gli alimenti	i medicinali scaduti	i pidocchi	le mosche del genere Anopheles	INFERMIERISTICA GENERALE
149	Qual è la caratteristica della miopia?	Il bulbo oculare è più lungo del normale	La completa rigidità del cristallino	Il bulbo oculare è infiammato	Una curvatura non regolare della cornea	INFERMIERISTICA GENERALE
150	Il roditore è serbatoio naturale della:	peste	febbre gialla	difterite	brucellosi	INFERMIERISTICA GENERALE
151	Qual è una caratteristica delle verruche?	Sono più frequenti sul dorso delle mani	Hanno guarigione spontanea	Sono di origine autoimmune	Non sono contagiose	INFERMIERISTICA GENERALE
152	La reazione di rigetto del trapianto è causata da:	linfociti T del ricevente	globuli rossi del ricevente	linfociti B del donatore	linfociti T del donatore	INFERMIERISTICA GENERALE
153	Quale tra queste è una caratteristica della meningite cerebrospinale epidemica?	Si trasmette per contatto diretto	Si trasmette con l'acqua non potabile	Si rimane contagiosi per un lungo periodo	Si trasmette dai rifiuti organici	INFERMIERISTICA GENERALE
154	Quale fattore è responsabile della durata della contumacia?	Periodo di incubazione	Sintomi iniziali	Medico curante	Gravità della malattia	INFERMIERISTICA GENERALE
155	Quale tra i seguenti agenti eziologici è causa di miocardite acuta?	Coxsackie virus B	CMV	VZV	Staphylococcus pyogenes	INFERMIERISTICA GENERALE
156	L'esantema varicellare è:	polimorfo (macule/papule/vescicole/pustole)	esclusivamente vescicolare	solo papulare	maculo-papulare	INFERMIERISTICA GENERALE
157	I principali antigeni dei virus influenzali sono:	emoagglutinina e neuroaminidasi	emolisina e monoaminidasi	monoaminidasi e neuroaminidasi	emolisina e neuraminidasi	INFERMIERISTICA GENERALE
158	Un paziente si ricovera per febbre di origine sconosciuta. I test di laboratorio evidenziano IgM anti EBV, pertanto il paziente è affetto da:	mononucleosi infettiva	salmonellosi	micobatteriosi	febbre gialla	INFERMIERISTICA GENERALE
159	Cosa sono le brucelle?	Gram negative, acapsulate, asporigene	Gram positive, acapsulate, asporigene	Gram negative, capsulate, sporigene	Gram positive, capsulate, sporigene	INFERMIERISTICA GENERALE
160	L'eziologia più comune dell'aneurisma dell'aorta addominale è:	arteriosclerotico	lue	HCV	ereditaria	INFERMIERISTICA GENERALE
161	La pressione endoculare nel soggetto normale:	varia fra 10 e 20 mmHg	si abbassa con l'età	oscilla fra 5 e 35 mmHg	è direttamente correlata con la pressione arteriosa	INFERMIERISTICA GENERALE
162	Dove ritroviamo prevalentemente le verruche piane?	Volto	Tronco	Regione sacrale	Palmo delle mani	INFERMIERISTICA GENERALE
163	Quale tra le seguenti malattie deve essere presa in considerazione in un paziente con dermatite seborroica grave?	Infezione da HIV	Leucemia mieloide	Sepsi gonococcica	Sifilide primaria	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

164	Quale delle caratteristiche non è peculiare dell’herpes simplex di tipo 1?	Associazione con la dermatite erpetiforme di Duhring	E' recidivante	L’esposizione al sole può portare all’eruzione	Lesioni vescicolose	INFERMIERISTICA GENERALE
165	Il BCG viene utilizzato come vaccinazione:	antitubercolare	antifungina	antitetanica	anticarbonchiosa	INFERMIERISTICA GENERALE
166	La diagnosi di AIDS in un soggetto sieropositivo si fa in caso di:	comparsa di patologie opportunistiche classificate	HIV-RNA nel plasma non rilevabile	HIV-RNA nel liquor cefalo-rachidiano	insorgenza di influenza	INFERMIERISTICA GENERALE
167	Quale tra le seguenti non è una manifestazione clinica dell’AIDS?	Influenza A	Herpes-Zoster	Toxoplasmosi cerebrale	Retinite da Cytomegalovirus	INFERMIERISTICA GENERALE
168	Prima di eseguire un intervento chirurgico in zone dove ci sono peli o capelli cosa si deve fare?	Tricotomia	Disinfezione con Dechin	Lavaggio con soluzione fisiologica	Lavaggio con alcool	INFERMIERISTICA GENERALE
169	In quale distretto va eseguita la paracentesi?	Fossa iliaca sinistra	Fossa iliaca destra	Pancreas	Epigastrio	INFERMIERISTICA GENERALE
170	Il ferro somministrato per via orale può causare:	disturbi gastrointestinali	policitemia	aumento delle transaminasi	prurito	INFERMIERISTICA GENERALE
171	L’insulina sottocutanea va evitata in caso di:	aree cutanee ustionate	aree cutanee ricche di adipe	nessuna delle altre risposte è corretta	ciclo mestruale	INFERMIERISTICA GENERALE
172	La pressione arteriosa diastolica di un adulto è:	70-90 mmHg	40-60 mmHg	90-110 mmHg	80-190 mmHg	INFERMIERISTICA GENERALE
173	I battiti cardiaci/minuto in un adulto sono:	60-80	90-100	>90	30-50	INFERMIERISTICA GENERALE
174	Prima di una mastectomia non è necessario:	posizionare correttamente l’arto interessato	fornire al paziente informazioni sull’intervento	preparare la barella per il trasporto in sala operatoria	sostegno psicologico	INFERMIERISTICA GENERALE
175	Il termine neurolettico:	indica le capacità di certi farmaci di ridurre la tensione nervosa e neurovegetativa producendo rilassamento	indica le patologie per le quali certi farmaci sono risultati efficaci	raggruppa tutti i farmaci attivi sul sistema nervoso	indica un’azione di stimolazione del farmaco sul SNC	INFERMIERISTICA GENERALE
176	Una situazione di bisogno sanitario non percepito è esemplificata da:	malattia in fase clinicamente silente	servizi sanitari incapaci di soddisfare il bisogno sanitario	nessuna delle altre risposte è corretta	alterazione morbosa che si traduca in sintomi avvertibili	INFERMIERISTICA GENERALE
177	Un aumento assoluto dei reticolociti è espressione di:	aumentata produzione di eritrociti	aumentata sopravvivenza degli eritrociti	aumentata attività del sistema reticolo-endoteliale	distruzione di eritrociti	INFERMIERISTICA GENERALE
178	Nel quadro dello shock settico manca:	bradicardia	brivido che precede l’ipotensione	cute calda e asciutta	ipotensione	INFERMIERISTICA GENERALE
179	Nell’ipertiroidismo uno di questi sintomi è per lo più assente. Quale?	Ipersensibilità al freddo	Astenia	Tremori	Perdita di peso	INFERMIERISTICA GENERALE
180	Tutte le seguenti situazioni patologiche rappresentano fattori di rischio per tumori del colon retto, tranne una. Quale?	Morbo di Crohn	Dieta ad alto contenuto di grassi e proteine animali	Poliposi multipla gastrointestinale	Rettocolite ulcerosa	INFERMIERISTICA GENERALE
181	Quale delle seguenti patologie è nota anche come malattia di Kahler - Bozzolo?	Mieloma multiplo	Colecistite cronica	Granuloma dentario	Polmonite	INFERMIERISTICA GENERALE
182	Se a distanza di 24-48 ore da una frattura di femore compare confusione mentale, allucinazioni, vomito, bisogna pensare a:	embolia cerebrale	focolaio epilettico	ictus cerebrale	emorragia cerebrale	INFERMIERISTICA GENERALE
183	L’anemia ipocromica è determinata da:	riduzione del contenuto emoglobinico medio	riduzione della concentrazione emoglobinica corpuscolare media	tutte le altre risposte sono corrette	riduzione del volume corpuscolare medio	INFERMIERISTICA GENERALE
184	Quale di questi sintomi è sempre presente nell’ittero emolitico?	Bilirubinuria	Emoglobinemia diminuita	Reticolociti aumentati	Urobilinuria	INFERMIERISTICA GENERALE
185	Nell’atelettasia di un polmone il mediastino:	si sposta dallo stesso lato	si sposta in alto	rimane fisso	si sposta controlateralmente	INFERMIERISTICA GENERALE
186	Quale delle seguenti è la più precoce alterazione rilevabile in corso di infarto miocardico acuto?	Sopralivellamento ST	Aumento del CPK	Aumento di LDH	Aumento della glicemia	INFERMIERISTICA GENERALE
187	Il sintomo più evidente di una peritonite è:	contrattura a quadrante	rigidità diffusa dell’addome	shock ipovolemico relativo	dolore spontaneo che si aggrava con la palpazione dell’addome	INFERMIERISTICA GENERALE
188	Nelle malattie diarroiche è molto importante evitare l’assunzione di:	nutrienti ad elevata osmolarità	proteine	amido	liquidi	INFERMIERISTICA GENERALE
189	La disfagia determina:	difficoltà nella deglutizione	assunzione di quantità eccessive di liquidi	avversione per i cibi solidi	dolore post-prandiale	INFERMIERISTICA GENERALE
190	Il tappo di cerume è causa di:	ipoacusia di trasmissione	nessuna delle altre risposte è corretta	difficoltà nell’equilibrio	otalgia ed acufeni	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

191	Qual è la caratteristica principale della lesione ulcerativa nel piede diabetico neuropatico?	Bordo dell'ulcera ipercheratosico	Scarsa tendenza alla riparazione se scarificata	Fondo della lesione non granuleggiante	Tendenza alla guarigione spontanea	INFERMIERISTICA GENERALE
192	I criptosporidi sono responsabili di:	diarrea	polmoniti	febbre	faringiti	INFERMIERISTICA GENERALE
193	L'emorragia rettale in medicina è definita come:	proctorragia	nessuna delle altre risposte è corretta	papilloma	melena	INFERMIERISTICA GENERALE
194	Il benzene agisce a livello di:	midollo osseo	milza	vescica	fegato	INFERMIERISTICA GENERALE
195	I vaccini misti sono composti da:	germi di malattie differenti	farmaci antivirali	germi e anatossine	ceppi diversi di una stessa specie	INFERMIERISTICA GENERALE
196	Cosa provoca l'intossicazione da cromo?	Dermatite ulcerativa, faringotracheite, nefropatia tubulare	Glomerulonefrite e nefropatia vascolare	Calcolosi renale	Coliche addominali, ipertensione	INFERMIERISTICA GENERALE
197	Chi ha inventato la scala dello sviluppo cognitivo?	Binet-Simon	Nessuna delle altre risposte è corretta	Freud	Jung	INFERMIERISTICA GENERALE
198	L'azione degli anticorpi prodotti in seguito ad immunizzazione tetanica è quella di:	neutralizzare la tossina prodotta dall'agente patogeno	impedire l'invasione sistemica da parte dell'agente patogeno	opsonizzare il Clostridium tetani	aumentare l'azione delle cellule T	INFERMIERISTICA GENERALE
199	Che cosa comporta il tricobezoario?	Capelli nello stomaco	Carcinoma del colon	Granuloma nel polmone	Infestazione parassitaria intestinale	INFERMIERISTICA GENERALE
200	Cos'è la nocicezione?	La ricezione, trasmissione ed elaborazione centrale dello stimolo doloroso	La soglia minima del dolore	La manifestazione di stimoli odorosi	Un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole	INFERMIERISTICA GENERALE
201	Nella steatosi osserviamo un accumulo di:	lipidi	carboidrati	proteine	lipasi	INFERMIERISTICA GENERALE
202	La terapia della meningite meningococcica prevede l'utilizzo di:	beta lattamici	antidolorifici	immunoglobuline	chinoloni	INFERMIERISTICA GENERALE
203	Quale dei seguenti microrganismi non è causa di infezione opportunistica in pazienti immunodepressi?	Neisseria gonorrhoeae	Virus Varicella-zoster	Pneumocystis carinii	Aspergillus fumigatus	INFERMIERISTICA GENERALE
204	Quale di queste complicanze si osserva in corso di parotite epidemica?	Tutte le altre risposte sono corrette	Nessuna delle altre risposte è corretta	Orchite	Pancreatite	INFERMIERISTICA GENERALE
205	Nella sindrome da inappropriata secrezione dell'ormone antidiuretico (ADH) quale terapia è controindicata?	Idratazione	Restrizione idrica	Diuretici	Sali di litio	INFERMIERISTICA GENERALE
206	Cosa producono i fibroblasti?	Fibre elastiche e collagene	Tutte le altre risposte sono corrette	Fibre muscolari	Fibre reticolari	INFERMIERISTICA GENERALE
207	Il virus SV40, a quale gruppo di virus appartiene?	Papovavirus	Retrovirus	Coronavirus	Herpesvirus	INFERMIERISTICA GENERALE
208	Quali batteri possono essere isolati nel paziente mediante coprocultura?	Shigella sonnei	Neisseria gonorrhoeae	Corynebacterium diphtheriae	Stafilococco aureus	INFERMIERISTICA GENERALE
209	Quale dei seguenti distretti corporei non ha flora residente?	Vescica	Apparato digerente	Apparato respiratorio superiore	Apparato genitale femminile	INFERMIERISTICA GENERALE
210	Quale delle seguenti manifestazioni cliniche può essere causata dalla Candida albicans?	Vulvo-vaginite	Diarrea	Febbre puerperale	Tigna	INFERMIERISTICA GENERALE
211	Dove sono collocate le porine dei batteri gram negativi?	Membrana esterna	Capsula batterica	Membrana citoplasmatica	Periplasma	INFERMIERISTICA GENERALE
212	Come viene definito un drenaggio di Bulao?	Drenaggio toracico	Sonda rettale	Drenaggio addominale	Drenaggio a valvola ad acqua	INFERMIERISTICA GENERALE
213	Per prelievi di campioni muco-cutanei serve un tampone di:	cotone	poliestere	alginato di calcio	nylon	INFERMIERISTICA GENERALE
214	Come si misura la pressione in arteria polmonare?	Con il catetere di Swan-Ganz	Con il catetere di Foley	Con la sonda di Hegar	Con la sonda di Sengstaken-Blackmore	INFERMIERISTICA GENERALE
215	Per la venipuntura si utilizzano aghi butterfly per:	riduzione del rischio di perforazione venosa	nessuna delle altre risposte è corretta	minor costo	maggiore sterilità	INFERMIERISTICA GENERALE
216	Quanti atti ventilatori/minuto compie un adulto:	16-18	19-23	42281	41547	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

217	Una donna di 36 anni riferisce amenorrea negli ultimi quattro mesi. Il test di gravidanza è negativo. I livelli sierici di LH e FSH sono elevati e l'estradiolo sierico è basso. Qual è l'orientamento diagnostico?	Menopausa prematura	Somministrazione esogena di estrogeni	Panipopituitarismo	Ovaio policistico	INFERMIERISTICA GENERALE
218	Quale tra i seguenti non è un reperto anatomico-patologico specifico della tetralogia di Fallot?	Comunicazione interatriale	Ipertrofia ventricolare destra	Comunicazione interventricolare	Destroposizione dell'aorta	INFERMIERISTICA GENERALE
219	Nel trauma cranico con sindrome neurologica occorre praticare quale prima indagine:	tomografia computerizzata	angiografia	ecografia	scintigrafia	INFERMIERISTICA GENERALE
220	Quale tra queste non è causa di insufficienza renale acuta?	Pielonefriti	Presenza di versamenti abbondanti	Emorragie profuse	Gravi ustioni	INFERMIERISTICA GENERALE
221	In un paziente con angina pectoris quale dei seguenti elementi è più importante per poter prevedere la sua sopravvivenza?	Il grado di ostruzione delle coronarie	L'entità del lavoro muscolare capace di indurre l'angor	La frequenza degli episodi anginosi	La durata della sindrome anginosa	INFERMIERISTICA GENERALE
222	Accertata la diagnosi di rene cistico, su quale altro organo si dovrebbe indagare con scintigrafia o ecografia?	Fegato	Cervello	Polmone	Cuore	INFERMIERISTICA GENERALE
223	Il paziente affetto frequentemente da micosi cutanee dovrà evitare uno dei seguenti comportamenti. Quale?	Uso di saponi alcalini	Tutte le altre risposte sono corrette	Esposizione prolungata alla luce solare	Uso di saponi acidi	INFERMIERISTICA GENERALE
224	Quale fra le seguenti affermazioni sulla pancreatite cronica è falsa?	Costituisce fattore di rischio per le neoplasie del pancreas	La ipertrigliceridemia familiare rappresenta un fattore di rischio per la sua insorgenza	Si possono riscontrare calcificazioni all'esame Rx diretto dell'addome in regione pancreatica	I segni clinici di insufficienza di secrezione esocrina compaiono per distruzione di parenchima superiore al 90%	INFERMIERISTICA GENERALE
225	Qual è l'evenienza clinica che consegue più frequentemente ad un'embolia dell'arteria polmonare?	Infarto polmonare	Infarto cardiaco	Pneumotorace	Atelettasia polmonare	INFERMIERISTICA GENERALE
226	Qual è la più frequente causa di cuore polmonare acuto:	embolia polmonare	infarto miocardico anteriore	infarto miocardico posteriore	stato asmatico	INFERMIERISTICA GENERALE
227	La terapia farmacologica per lo shock anafilattico prevede l'uso di:	cortisonici e adrenalina	dopamina	diidralazina	valproato	INFERMIERISTICA GENERALE
228	Quale tra le seguenti situazioni non è provocata da stenosi mitralica?	Ipertrofia ventricolare sinistra	Fibrillazione atriale	Ipertensione polmonare	Ipertrofia ventricolare destra	INFERMIERISTICA GENERALE
229	Qual è il sintomo che consente di fare diagnosi di paralisi progressiva sopranucleare e non di Parkinson?	Alterazione dei movimenti oculari	Tremore	Bradicinesia	Rigidità	INFERMIERISTICA GENERALE
230	Cos'è un T.I.A.?	Attacco ischemico transitorio	Turba ischemica acuta	Trombosi improvvisa acuta	Trombosi istantanea acuta	INFERMIERISTICA GENERALE
231	Il metadone è utilizzato in sostituzione di:	eroina	cannabinoidi	cocaina	etanolo	INFERMIERISTICA GENERALE
232	A quale categoria di farmaci appartengono le benzodiazepine?	Sedativi	Antiaritmici	Diuretici	Miocardiotonici	INFERMIERISTICA GENERALE
233	In quale forma fisica una sostanza è più rapidamente assorbibile a livello polmonare?	Gas	Nebulizzata	Solida	Liquida	INFERMIERISTICA GENERALE
234	Quale tra i seguenti farmaci non appartiene alla classe degli antidepressivi triciclici?	Fluoxetina	Imipramina	Amitriptilina	Doxepina	INFERMIERISTICA GENERALE
235	La mioclonia è:	una contrazione muscolare rapida seguita da rilassamento	una contrazione muscolare tonica	una forma di epilessia	una manifestazione neurodegenerativa	INFERMIERISTICA GENERALE
236	Su quale delle seguenti azioni si fonda l'aprassia ideativa?	Incapacità di eseguire nella giusta successione i movimenti che compongono un atto	Sostituire ai movimenti corretti di un gesto, gesti automatici o incompleti o amorfi	Mancato movimento voluto	Capacità di compiere un atto involontario	INFERMIERISTICA GENERALE
237	La trasmissione di quale microrganismo è facilitata dalla presenza di acque stagnanti in zona tropicale?	Schistosoma mansoni	Neisseria gonorrea	Taenia saginata	Mycobacterium tuberculosis	INFERMIERISTICA GENERALE
238	Quale malattia è stata ufficialmente eradicata a livello mondiale?	Il vaiolo	La lebbra	La tubercolosi	La brucellosi	INFERMIERISTICA GENERALE
239	Si definisce ritenzione urinaria:	la mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica	il bruciore durante la minzione	la produzione di urina < 400 ml/24 ore	la produzione di urina > 700 ml/24 ore	INFERMIERISTICA GENERALE
240	L'Amanita phalloides colpisce prevalentemente:	fegato	snc	pancreas	milza	INFERMIERISTICA GENERALE
241	Quando si considera contagioso il morbillo?	Da due giorni prima a quattro giorni dopo la comparsa dell'esantema	Durante tutta la fase esantematica	Durante la fase di incubazione	Tre giorni prima della comparsa dell'esantema	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

242	Gli agenti eziologici di meningite a liquor torbido comprendono:	S. pneumonite, N. meningitidis e H. influenzae	S. pneumoniae	N. meningitidis	M. tuberculosis	INFERMIERISTICA GENERALE
243	Gli adenovirus determinano:	tutte le altre risposte sono corrette	diarrea	sindrome pertussica	cistite emorragica	INFERMIERISTICA GENERALE
244	Quali miceti colpiscono i soggetti immunocompromessi?	Tutte le altre risposte sono corrette	Candida	Mucor	Aspergillus	INFERMIERISTICA GENERALE
245	Nella brucellosi:	l'emocultura è diagnostica nella prima settimana di malattia e la sierodiagnosi di Wright è diagnostica nella seconda settimana di malattia	l'emocultura è diagnostica nella prima settimana di malattia	la sierodiagnosi di Wright è diagnostica nella seconda settimana di malattia	la sierodiagnosi di Wright è diagnostica nella terza settimana di malattia	INFERMIERISTICA GENERALE
246	In Italia, quale delle vaccinazioni seguenti è obbligatoria?	Nessuna delle altre risposte è corretta	BCG	Vaiolo	Rabbia	INFERMIERISTICA GENERALE
247	Nella colorazione di gram risultano colorati di violetto:	i batteri gram positivi	i batteri gram negativi	i batteri sporigeni	i funghi	INFERMIERISTICA GENERALE
248	Quale dei seguenti cateteri viene maggiormente utilizzato per la vescica?	Foley	Broviac	Fleming	Hegar	INFERMIERISTICA GENERALE
249	Quant'è il volume polmonare corrente in un individuo sano, misurabile in centimetri cubici?	500 cm ³	110 cm ³	320 cm ³	430 cm ³	INFERMIERISTICA GENERALE
250	Dopo aver inserito un catetere di Foley, cosa bisogna fare per accertarsi dell'esatta posizione?	Tutte le altre risposte sono corrette	Iniettare soluzione fisiologica	Far defluire l'urina	Gonfiare il palloncino	INFERMIERISTICA GENERALE
251	Quale deve essere il ruolo svolto dall'infermiere in caso di puntura lombare?	Tutte le altre risposte sono corrette	Mantenere la testa del paziente anteroflessa	Mantenere le ginocchia del paziente vicino al torace	Far assumere al paziente un decubito laterale	INFERMIERISTICA GENERALE
252	Quale procedura si effettua prima di un intervento chirurgico all'intestino?	Tutte le altre risposte sono corrette	Somministrazione di antibiotici non assorbibili	Purganti per tre giorni prima dell'intervento	Clisteri per tre giorni prima dell'intervento	INFERMIERISTICA GENERALE
253	Quale può essere la causa di un trauma spinale?	Tutte le altre risposte sono corrette	Incidente stradale	Tuffo	Ferita da fuoco	INFERMIERISTICA GENERALE
254	In che momento deve essere fatto il prelievo ematico per emocultura?	Nessuna delle altre risposte è corretta	Non appena compare uno stato febbrile	Dopo cinque giorni di terapia antibiotica	Appena si effettua il ricovero	INFERMIERISTICA GENERALE
255	Cosa bisogna fare, in caso di ferita con materiale infettato dal virus HIV?	Iniziare immediatamente profilassi con AZT	Iniziare immediatamente una cura antibiotica	Fare il test HIV entro 48 ore	Contattare entro 24 ore un infettivologo	INFERMIERISTICA GENERALE
256	Un pap-test falso negativo può essere dovuto a:	tutte le altre risposte sono corrette	prelievo non adeguato	fattori casuali	operatore non esperto	INFERMIERISTICA GENERALE
257	Quale dei seguenti è il sintomo più frequente dell'acidosi metabolica?	polipnea	nausea e vomito	astenia	cefalea	INFERMIERISTICA GENERALE
258	Quale tra queste non è una complicanza intestinale della malattia di Crohn?	Poliposi	Aderenze	Fistole	Fibrosi	INFERMIERISTICA GENERALE
259	Nella pancreatite acuta tutte le seguenti affermazioni sul dolore sono vere, tranne una. Quale?	Dolore non associato a nausea e vomito	Insorgenza improvvisa	Localizzazione diffusa all'epigastrio	Irradiazione al dorso	INFERMIERISTICA GENERALE
260	Cosa s'intende per insonnia?	Tutte le altre risposte sono corrette	Difficoltà ad iniziare e a mantenere il sonno	Difficoltà del sonno correlata a un disturbo fisico	Difficoltà del sonno correlata all'assunzione di sostanze psicoattive	INFERMIERISTICA GENERALE
261	In tutte le seguenti malattie si osserva eosinofilia, tranne in una. Quale?	Brucellosi	Linfoma di Hodgkin	Dermatiti allergiche	Edema di Quincke	INFERMIERISTICA GENERALE
262	La porpora si riscontra più frequentemente in caso di:	piastrinopenia	vasculopatia	trombocitosi	coagulopatia congenita	INFERMIERISTICA GENERALE
263	La sintomatologia caratterizzata da dolore biliare, ittero e febbre settica si riscontra nella litiasi:	del coledoco	intraepatica	della colecisti	del dotto di Wirsung	INFERMIERISTICA GENERALE
264	Da quale delle seguenti condizioni è caratterizzato l'aumento della pressione arteriosa differenziale?	Insufficienza aortica	Ipertensione nefrovascolare	Stenosi aortica	Stenosi polmonare	INFERMIERISTICA GENERALE
265	L'angina instabile per definizione è caratterizzata da:	esordio o peggioramento della sintomatologia anginosa	crisi esclusivamente a riposo	crisi associate ad aritmie	crisi con manifestazioni neurovegetative	INFERMIERISTICA GENERALE
266	In quale di queste condizioni la potassiemia risulta diminuita?	Diarrea cronica	Insufficienza renale acuta	Insufficienza surrenale cronica	Crisi emolitica acuta	INFERMIERISTICA GENERALE
267	Quale di queste sostanze oppioidi non crea un alto rischio di dipendenza?	Codeina	Eroina	Metadone	Morfina	INFERMIERISTICA GENERALE
268	La calcolosi del coledoco è caratterizzata da tutti i seguenti sintomi, tranne uno. Quale?	Ittero ingravescente	Dolore di tipo colico	Ittero intermittente	Febbre con brivido	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

269	La complicità più frequente di una frattura esposta è:	lifezione	emorragia	formazione di ematoma	frammentazione dei monconi ossei	INFERMIERISTICA GENERALE
270	L'aumento del CEA è più caratteristico per i tumori di:	grosso intestino	cervello	polmone	prostata	INFERMIERISTICA GENERALE
271	Tutte le seguenti condizioni possono verificarsi in presenza di un aneurisma dissecante dell'aorta, tranne:	insufficienza mitralica acuta	anisofigmia a livello degli arti superiori	perdita di coscienza	insufficienza aortica	INFERMIERISTICA GENERALE
272	La leucemia mieloide cronica è:	una leucemia frequente che colpisce tutte le età	una leucemia poco frequente che colpisce l'età evolutiva	una leucemia poco frequente che colpisce i soggetti dopo i 50 anni	una leucemia poco frequente che colpisce tutte le età	INFERMIERISTICA GENERALE
273	La diagnosi di stenosi valvolare cardiaca si stabilisce con:	ecodoppler con determinazione del gradiente pressorio	angiocardiografia	emogasanalisi	cateterismo coronarico	INFERMIERISTICA GENERALE
274	Quale delle seguenti sostanze possiede una maggiore capacità oncogena?	Cloruro di vinile monomero	Solfuro di carbonio	Toluolo	Anilina	INFERMIERISTICA GENERALE
275	Sono cause di demenza non reversibile:	tutte le altre risposte sono corrette	le malattie degenerative	la malattia di Creutzfeldt-Jacob	le infezioni SNC	INFERMIERISTICA GENERALE
276	La valutazione del danno d'organo in un paziente in condizioni di ipertensione comprende:	tutte le altre risposte sono corrette	esame della retina	esame dei polsi periferici	ECG e Rx torace	INFERMIERISTICA GENERALE
277	Nell'anziano il rischio di cadute è dovuto essenzialmente a:	tutte le altre risposte sono corrette	alterazioni vestibolari	alterazioni visive	alterazioni della propriocezione	INFERMIERISTICA GENERALE
278	La valutazione della funzione piastrinica può essere effettuata attraverso:	tutte le altre risposte sono corrette	il tempo di sanguinamento	il dosaggio del fattore di von Willebrand	l'aggregometria piastrinica	INFERMIERISTICA GENERALE
279	In caso di avvelenamento l'emesi non può essere indotta se:	tutte le altre risposte sono corrette	il paziente è comatoso	il paziente è affetto da gravi malattie cardiovascolari	il paziente è sotto i sei mesi di vita	INFERMIERISTICA GENERALE
280	In un paziente in stato di decubito, la misurazione della PVC va eseguita ponendo lo stesso:	in posizione supina	in posizione laterale sx	semiortopnoico	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
281	Se si effettua una trasfusione di sangue incompatibile ad un paziente, questo manifesterà:	reazione emolitica	edema generalizzato	complicanze infettive	riduzione delle proteine plasmatiche	INFERMIERISTICA GENERALE
282	Cosa s'intende per piombemia?	Misurazione della presenza di piombo nel sangue totale	Misurazione della presenza di piombo nei globuli rossi	Misurazione della presenza di piombo nelle feci	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
283	Nella relazione con un paziente schizofrenico in generale non è opportuno:	tentare di dimostrare su basi razionali l'inesistenza del delirio	prestare attenzione ai sentimenti che stanno dietro al delirio	non pensare di dover sempre dire qualcosa e dare spazio all'ascolto attivo	essere autentici	INFERMIERISTICA GENERALE
284	Quale dei seguenti gas viene usato nell'anestesia generale inalatoria?	Protossido di azoto	Monossido di azoto	Ossido di azoto	Anidride carbonica	INFERMIERISTICA GENERALE
285	Come viene definito un polso con frequenza < 60 b/mp:	bradicardico	normale	nessuna delle altre risposte è corretta	aritmico	INFERMIERISTICA GENERALE
286	Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente gli effetti dell'analgesia peridurale?	Allevia i dolori del parto	Diminuisce l'indice di Apgar dei neonati	Diminuisce il rischio di complicanze nel parto	Aumenta il tasso dei tagli cesarei	INFERMIERISTICA GENERALE
287	Per quale delle seguenti patologie viene usata la manovra di Giordano?	Renale	Polmonare	Epatica	Prostatica	INFERMIERISTICA GENERALE
288	Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente l'utilità del test di Amsler?	Le metamorfopsie	La trasformazione della pressione oculare	L'aumento della capacità visiva	La densità della cataratta	INFERMIERISTICA GENERALE
289	Primo livello di ipoacusia. L'esame indicato è:	Audiometria	Retinogramma	Nessuna delle altre risposte è corretta	Ecg	INFERMIERISTICA GENERALE
290	In caso di legionella, e per scongiurarne la diffusione, l'acqua potabile deve essere mantenuta:	a temperatura di acqua fredda < 20°C e acqua calda > 60°C	a temperatura di acqua fredda < 25°C e acqua calda = 55°C	nessuna delle altre risposte è corretta	a temperatura di acqua fredda = 0°C e acqua calda > 35°C	INFERMIERISTICA GENERALE
291	Nei disturbi del linguaggio di tipo afasico, viene comunemente utilizzato il test di:	Token	Broca	Pinel	Binet	INFERMIERISTICA GENERALE
292	Test tuberculinico positivo. Si evince:	malattia da batteri gram positivi	malattia da batteri gram negativi	tutte le altre risposte sono corrette	infezione tubercolare	INFERMIERISTICA GENERALE
293	La febbre intermittente è quella febbre che:	scende sempre sotto i 37 °C	a volte scende sotto i 37 °C	si accompagna a una sudorazione profusa	non scende mai al di sotto dei 37 °C	INFERMIERISTICA GENERALE
294	La scala di valutazione OMS per il dolore muscolo-scheletrico consta di:	3 livelli	4 livelli	5 livelli	2 livelli	INFERMIERISTICA GENERALE
295	Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente le implicazioni del processo di fonazione?	E' predominante l'espiazione	E' predominante l'inspirazione	Possibilità di azione deglutitoria	Presenza di dinamica aerea espiratoria attiva	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

296	Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente lo scopo della posizione di Fowler?	Una migliore funzionalità ventilatoria	La rimozione di corpi estranei dall’esofago	L’esplorazione della prostata	L’esecuzione del clistere evacuativo	INFERMIERISTICA GENERALE
297	Alcune ore dopo un’ustione. La reidratazione viene effettuata attraverso:	soluzione di Ringer lattato	nessuna delle altre risposte è corretta	soluzione fisiologica	siero	INFERMIERISTICA GENERALE
298	Prelievo per emogasanalisi. Occorre preparare una siringa sterile da:	2 ml eparinata	nessuna delle altre risposte è corretta	5,5 ml non eparinata	insulina eparinata	INFERMIERISTICA GENERALE
299	Parlando di monitoraggio giornaliero, un paziente si definisce oligurico quando:	la diuresi oraria è inferiore a 0,5 ml/kg	la diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml	la diuresi giornaliera è inferiore a 800 ml	la diuresi oraria è 1 ml/kg	INFERMIERISTICA GENERALE
300	In ambito infermieristico, l'acronimo ASO indica:	Accertamento Sanitario Obbligatorio	Azienda Senza Operatori	Assistenza Sanitaria Operatoria	Assistenza Socio - OSS	INFERMIERISTICA GENERALE
301	In ambito infermieristico, l'acronimo DSM indica:	Dipartimento Salute Mentale	Dispositivo Solo per Medici	Dispositivo Sanitario Medico	Dipartimento Solo Medico	INFERMIERISTICA GENERALE
302	In ambito infermieristico, l'acronimo BMI indica:	Body Mass Index	Bronco Mielite Interstiziale	Bronchite Mielite ad Intermittenza	Blood Mass Intrapheritoneal	INFERMIERISTICA GENERALE
303	In ambito infermieristico, l'acronimo BLS indica:	Basic Life Support	Blood Linear Support	Linea Base Sanitaria	Bronchite Lineare Superficiale	INFERMIERISTICA GENERALE
304	In ambito infermieristico, l'acronimo SDO indica:	Scheda di Dimissione Ospedaliera	Scheda di Diagnosi OSS	Servizio Domiciliare di Orientamento	Servizio di Diagnosi Ospedaliera	INFERMIERISTICA GENERALE
305	In ambito infermieristico, l'acronimo PA indica:	Pressione Arteriosa	Portata Atmosferica	Pressione Atmosferica	Portata Arteriosa	INFERMIERISTICA GENERALE
306	In ambito infermieristico, l'acronimo FC indica:	Frequenza Cardiaca	Fisiologia Cardiaca	Formazione Comune	Feci Compatte	INFERMIERISTICA GENERALE
307	In ambito infermieristico, l'acronimo CV indica:	Catetere Vescicale	Catetere Vetusto	Callo Valvolare	Catetere Veicolato	INFERMIERISTICA GENERALE
308	In ambito infermieristico, l'acronimo TC indica:	Temperatura Corporea	Temperatura Craniale	Temperatura Certa	Temperatura Corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
309	In ambito infermieristico, l'acronimo PS indica:	Pronto Soccorso	Primo Soccorso	Primo Salvamento	Pronto Salvamento	INFERMIERISTICA GENERALE
310	In ambito infermieristico, l'acronimo SAD indica:	Servizio Assistenza Domiciliare	Servizio Assistenza Disabili	Servizio Assistenza Demenze	Servizio Accoglienza Demenze	INFERMIERISTICA GENERALE
311	In ambito infermieristico, con l'acronimo FR si indica:	Frequenza Respiratoria	Frequenza Ritmica	Frequenza Relativa	Familiarità Relazionale	INFERMIERISTICA GENERALE
312	In ambito infermieristico, la somministrazione SC avviene:	sottocute	solo cerotto	supercerotto	sopracute	INFERMIERISTICA GENERALE
313	In ambito infermieristico, l'acronimo DPI indica:	Dispositivi di Protezione Individuale	Dispositivi Protezione Infetti	Dispositivi Protezione Inalterati	Dispositivi Protezione Inefficaci	INFERMIERISTICA GENERALE
314	In ambito infermieristico, l'acronimo NE indica:	Nutrizione Enterale	Età Neonatale	Non Estensibile	Non Eccedere	INFERMIERISTICA GENERALE
315	In ambito infermieristico, l'acronimo ECG indica:	Elettrocardiogramma	Elettroencefalogramma	Elettrocoagulazione	Elettromiografia	INFERMIERISTICA GENERALE
316	In ambito infermieristico, l'acronimo BPCO indica:	Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva	Bronchite Cronica Ostruttiva	Bronchite Persistente Cronica Ostruttiva	Broncopolmonite Cronica Ostruttiva	INFERMIERISTICA GENERALE
317	In ambito infermieristico, l'acronimo RSD indica:	Residenza Sanitaria Disabili	Residenza Sociale Demenze	Residenza Sanitaria Demenze	Residenza Sociale Disabili	INFERMIERISTICA GENERALE
318	In ambito infermieristico, l'acronimo IMA indica:	Infarto Miocardico Acuto	Infarto Muscolare Acuto	Infarto Malato Anziano	Infarto Medio Acuto	INFERMIERISTICA GENERALE
319	In ambito infermieristico, l'acronimo RCP indica:	Rianimazione Cardiopolmonare	Respirazione Cardiopolmonare	Reazione Cardiopolmonare	Riflesso Cardiopolmonare	INFERMIERISTICA GENERALE
320	In ambito infermieristico, l'acronimo SSR indica:	Servizio sanitario regionale	Servizio sociale regionale	Servizio sanitario riservato	Servizio sociosanitario regionale	INFERMIERISTICA GENERALE
321	In ambito infermieristico, l'acronimo IM indica:	Intramuscolo	Indicazione medica	In media	In medicina	INFERMIERISTICA GENERALE
322	In ambito infermieristico, l'acronimo ICA indica:	Infezioni correlate all’assistenza	Istituti contro gli abusi	Infezioni contratte all’aperto	Infezioni contratte in ambulanza	INFERMIERISTICA GENERALE
323	In ambito infermieristico, l'acronimo ARDS indica:	Sindrome da distress respiratorio acuto	Sindrome da distress respiratorio nell’adulto	Sindrome da russamento acuto	Sensazione di disagio respiratorio all’aperto	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

324	In ambito infermieristico, l'acronimo MMG indica:	Medico di medicina generale	Medico di medicina geriatrica	Menomazione mentale generalizzata	Gestione malattia miocardica	INFERMIERISTICA GENERALE
325	In ambito infermieristico, l'acronimo EMG indica:	Elettromiografia	Elettromiocardiografia	Elettrografia mensile	Elettromediografia	INFERMIERISTICA GENERALE
326	In ambito infermieristico, l'acronimo PEG indica:	Gastrostomia endoscopica percutanea	Progetto esterno di gestione	Portata enterale giornaliera	Pressione endogastrica	INFERMIERISTICA GENERALE
327	In ambito infermieristico, l'acronimo NPT indica:	Nutrizione parenterale totale	Necessario pasto tritato	Nutrizione pre trattamento	Nursing post traumatico	INFERMIERISTICA GENERALE
328	In ambito infermieristico, l'acronimo FANS indica:	Farmaci anti-infiammatori non steroidei	Farmaci anti-dolorifici non steroidei	Farmaci ancora non sospesi	Farmaci anti nausea sensibili	INFERMIERISTICA GENERALE
329	In ambito infermieristico, l'acronimo ADI indica:	Assistenza domiciliare integrata	Assistente domestica italiana	Assistenza domiciliare interattiva	Assistenza domiciliare intensiva	INFERMIERISTICA GENERALE
330	In ambito infermieristico, l'acronimo SNG indica:	Sondino naso gastrico	Sondino nasale gommato	Sondino nasale gonfiato	Sondino non gonfiato	INFERMIERISTICA GENERALE
331	In ambito infermieristico, l'acronimo RSA indica:	Residenza sanitaria assistenziale	Residenza sanitaria assistita	Residenza socio assistita	Residenza socio assistenziale	INFERMIERISTICA GENERALE
332	In ambito infermieristico, l'acronimo MRGE indica:	Malattia da reflusso gastro esofageo	Malattia da rigurgito gestazionale	Malattia da reflusso gastro enterico	Medicazione ricorrente con gentamicina	INFERMIERISTICA GENERALE
333	In ambito infermieristico, l'acronimo EEG indica:	Elettroencefalogramma	Ematoma esteso grave	Elettrocardiogramma esterno	Emorragia gastro/enterica	INFERMIERISTICA GENERALE
334	In ambito infermieristico, l'acronimo ADP indica:	Assistenza domiciliare programmata	Adenosintrifosfato	Assistenza domiciliare perpetua	Alterata deambulazione parziale	INFERMIERISTICA GENERALE
335	Durante la compilazione della cartella clinica, un infermiere risponde di falso ideologico quando:	attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute	si rifiuta di compilare la cartella clinica per motivi ideologici	fa compilare la cartella ad un altro operatore	esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati	INFERMIERISTICA GENERALE
336	In quale caso può essere indicata la cardioversione elettrica sincronizzata?	Flutter atriale	Tachicardia ventricolare senza polso	Dissociazione elettromeccanica	Fibrillazione elettrica	INFERMIERISTICA GENERALE
337	Da cos'è contraddistinta l'afasia espressiva?	Linguaggio limitato, articolazione rallentata e grammatica ridotta	Incapacità totale sia nel linguaggio verbale sia in quello scritto	Disturbo del linguaggio risultante da debolezza del controllo motorio, paralisi e scoordinazione	Linguaggio fluente, ben articolato e contenuti disorganizzati	INFERMIERISTICA GENERALE
338	Completare la seguente frase: "_____ non avviene l'assorbimento delle sostanze alimentari".	Nel colon	Nel duodeno	Nell'ileo	Nel digiuno	INFERMIERISTICA GENERALE
339	Con quale formula si calcola la sensibilità di un test diagnostico?	Veri positivi/totali malati	Veri positivi/totale sani	Veri negativi/totali sani	Falsi negativi/totali sani	INFERMIERISTICA GENERALE
340	Cosa prevede il trattamento della pancreatite acuta?	Il continuo svuotamento del contenuto gastrico	Interventi specifici per arrestare la flogosi e la necrosi pancreatica	Il frazionamento dei pasti limitando il contenuto glucidico	Tutte le altre risposte sono corrette	INFERMIERISTICA GENERALE
341	La sperimentazione clinica controllata in doppio cieco si ha quando:	né il paziente né lo sperimentatore sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato	i gruppi di controllo sono due	né il paziente né lo statistiche elabora i dati sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato	né il paziente né i suoi parenti sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato	INFERMIERISTICA GENERALE
342	Completare la seguente frase: "Il maggior effetto di un'insulina ad azione intermedia somministrata per via sottocutanea si ottiene dopo _____ ore".	6-8	10-16	12-20	2-3	INFERMIERISTICA GENERALE
343	Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta una complicanza precoce della tracheotomia?	L'enfisema sottocutaneo	La fistola tracheo-esofagea	L'infezione respiratoria	La stenosi tracheale	INFERMIERISTICA GENERALE
344	In ambito infermieristico, nei casi di pazienti con chetoacidosi diabetica, riveste importanza critica la reintegrazione del:	Potassio	Magnesio	Calcio	Bicarbonato	INFERMIERISTICA GENERALE
345	Completare la seguente frase: "_____ sono analgesici non oppioidi".	Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Naprossene	Acido acetilsalicilico, Ketopofene, Fentanyl	Acido acetilsalicilico, Meperidina, Ketoprofene	Ibuprofene, Naprossene, Oxidodone	INFERMIERISTICA GENERALE
346	La legge n. 120/2001 e s.m.i., che norma l'uso dei defibrillatori semiautomatici al personale non sanitario, consente l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera:	a tutti i cittadini non medici che abbiano ricevuto una formazione specifica nell'attività di rianimazione cardiopolmonare	a tutti i soccorritori	a tutti i soccorritori purché sia fatta a bordo delle ambulanze	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
347	Cosa si intende per "port-a-cath"?	Un accesso venoso centrale che può rimanere in sede per un più lungo periodo, pertanto è principalmente utilizzato nei pazienti oncologici	Un catetere arterioso impiantato per somministrazione di grandiquantitativi di farmaci	Un dispositivo di regolazione del ritmo cardiaco totalmente impiantabile	Un tipo di ago cannula utilizzato per somministrazione di antitumorali e radiofarmaci	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

348	Nell'ambito delle professioni sanitarie, essendo in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo, l'infermiere è l'operatore sanitario che è responsabile di:	assistenza generale infermieristica	elaborazione dati e ricerca in ambito sanitario	guida e supporto al profilo riabilitativo dell'utente	ricerche relative ad analisi biomediche e biotecnologiche	INFERMIERISTICA GENERALE
349	Che cosa comporta il principio etico di autonomia, in ambito sanitario?	Il diritto dell'assistito a ricevere informazioni adeguate e accurate per essere in grado di operare una scelta libera da imposizioni esterne	Il diritto a scegliere come e dove curarsi, potendo scegliere fra Servizio sanitario pubblico e Sanità privata	Il diritto ad ottenere tutti i presidi che consentono di muoversi autonomamente, in forma gratuita	Il diritto di esprimere il proprio consenso all'atto sanitario	INFERMIERISTICA GENERALE
350	Che cosa s'intende per "modello organizzativo"?	L'insieme di regole che controllano il funzionamento dell'organizzazione in relazione alla sua mission	Un prototipo di comportamento professionale	L'applicazione di un sistema di norme giuridiche e deontologiche	L'applicazione concreta della mission aziendale	INFERMIERISTICA GENERALE
351	Completare la seguente frase: "Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non provocare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di _____ giorni".	cinque	sette	due	tre	INFERMIERISTICA GENERALE
352	Quale tra le seguenti opzioni di risposta indica una competenza che non è propria dell'organizzazione infermieristica?	Stabilire la programmazione degli accessi alle strutture sanitarie	Gestire i processi, definire linee guida, protocolli, procedure assistenziali	Definire gli indicatori di fabbisogno delle risorse assistenziali	Definire standard e indicatori assistenziali professionali adeguati ai fabbisogni	INFERMIERISTICA GENERALE
353	A cosa fa riferimento il termine "carica microbica":	al quantitativo di microrganismi necessario a provocare l'infezione	alla capacità di abbattere le barriere meccaniche che difendono dall'infezione	alla capacità complessiva di penetrazione di un batterio attraverso gli orifizi naturali	alla capacità di un microrganismo di stabilirsi sulle mani e sugli strumenti sanitari, consentendo il trasferimento all'ospite suscettibile	INFERMIERISTICA GENERALE
354	Che cosa s'intende col termine "granulociti"?	Cellule della serie bianca con inclusioni citoplasmatiche	Organuli citoplasmatici dotati di peduncoli	Minuscoli granuli di tessuto specifico tubercolare	Cellule tumorali dovute a proliferazione di origine flogistica	INFERMIERISTICA GENERALE
355	[Per la risoluzione del quesito, indicare quale opzione di risposta contiene la giusta sequenza di "Vero" (V) / Falso (F)] Secondo le linee guida del CDC, per le somministrazioni sottocute la disinfezione preliminare della cute deve soddisfare i seguenti requisiti: * Cute pulita * Uso di antisettico * Uso di soluzioni a base alcolica * Strofinamento della cute per 30 secondi.	V; V; F; F	V; V; F; V	V; F; V; F	F; V; F; F	INFERMIERISTICA GENERALE
356	In ambito clinico, che cos'è la "compromissione della mobilità"?	Una diagnosi infermieristica	Una diagnosi riabilitativa	Una complicanza clinica	Un problema collaborativo	INFERMIERISTICA GENERALE
357	Con riferimento al processo di assistenza infermieristica, la valutazione NON è:	la fase in cui vengono decisi gli interventi	l'ultima fase del processo	la fase che precede una nuova raccolta dei dati	il momento della verifica degli obiettivi prefissati	INFERMIERISTICA GENERALE
358	Le misure di isolamento in ospedale, al momento, prevedono l'uso di quali precauzioni?	L'uso di precauzioni standard e aggiuntive	L'uso di precauzioni standard e per liquidi biologici	L'uso di precauzioni universali	L'uso di precauzioni per liquidi biologici	INFERMIERISTICA GENERALE
359	Per quanto riguarda la prevenzione terziaria, il suo scopo è:	la riabilitazione	la bonifica ambientale	la diagnosi precoce	la prevenzione della malattia	INFERMIERISTICA GENERALE
360	Che cosa rappresenta la cute non integra, nella "catena delle infezioni"?	La porta d'ingresso	La modalità di trasmissione	Il vettore infettivo	L'agente infettivo	INFERMIERISTICA GENERALE
361	Quante compresse da 0,25 mg deve somministrare un infermiere per ottenere 0,125 mg di dosaggio?	Mezza compressa	Una compressa più mezza	Due compresse	Secondo indicazione medica	INFERMIERISTICA GENERALE
362	Che cos'è fondamentale in un neonato con basso peso?	Un continuo riscaldamento per mantenere l'isoterma	Un'infusione endovenosa continua per evitare la disidratazione	Un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo	Un'alimentazione latte per evitare l'ipoglicemia	INFERMIERISTICA GENERALE
363	La "Conta Microbica Totale" è un rilievo fondamentale, in sala operatoria, poiché indica:	il numero delle unità formanti colonia che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 48 ore a 36° C	il numero di germi che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 24 ore a 36° C	il numero di germi che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 48 ore a 36° C	il numero delle Unità Formanti Colonie che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 96 ore a 36° C	INFERMIERISTICA GENERALE
364	Completare la seguente frase: "Nel caso in cui si utilizzi un deflussore che eroga 10 gocce per 1 millilitro, per regolare la velocità di infusione allo scopo di somministrare un litro di soluzione in circa otto ore, occorre regolare il deflussore in modo che si somministrino _____ al minuto".	20 gocce	30 gocce	40 gocce	10 gocce	INFERMIERISTICA GENERALE
365	Dividere mentalmente il gluteo in quattro quadranti: se l'infermiere pratica un'iniezione intramuscolare nel quadrante superiore esterno, quale sede è stata scelta?	Dorsogluteare	Rettofemorale	Deltoide	Ventrogluteare	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

366	In relazione alle forze meccaniche che influiscono in maniera negativa sulla funzione tegumentaria, la pressione può avere come effetto:	la distruzione di un'area tissutale più o meno circoscritta	lo scorrimento degli strati tissutali l'uno sull'altro	le verruche	le macerazioni	INFERMIERISTICA GENERALE
367	Somministrando 500 cc di glucosata al 5% si garantisce:	l'apporto di Kcal 100	l'apporto di Kcal 500	l'apporto di Kcal 300	l'apporto di Kcal 200	INFERMIERISTICA GENERALE
368	Secondo quanto appreso dalla letteratura in materia, le sedi consigliate per le iniezioni intramuscolari sono:	cinque	dieci	due	tre	INFERMIERISTICA GENERALE
369	Nel caso in cui un paziente iperteso in reparto ha epitassi, l'infermiera deve preoccuparsi di garantirgli una posizione:	con capo chino in avanti, posizionando sotto il mento una arcella per valutare l'entità della perdita ematica	di Trendelenburg	con capoflesso all'indietro, tamponando con garze il naso	con capo flesso all'indietro, tamponando con garze il naso e posizionando sulla fronte una garza bagnata fredda	INFERMIERISTICA GENERALE
370	Quando deve avvenire l'applicazione delle calze elastiche, ad una persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori?	Prima di alzarsi dal letto al mattino	Dopo aver camminato	Dopo aver effettuato l'igiene personale	Tutte le volte che sente le gambe appesantite	INFERMIERISTICA GENERALE
371	Completare la frase con l'opzione corretta: "Un infermiere sta rianimando un paziente e si sta preparando a somministrargli un farmaco che deve agire rapidamente. Il metodo _____ assicura l'effetto più rapido".	endovenoso in bolo	endovenoso a volume controllato	intramuscolare	sottocutaneo	INFERMIERISTICA GENERALE
372	Si riporta il caso di un infermiere che assiste un paziente che ha bisogno di ricevere aiuto durante i pasti. Il paziente si scusa con l'infermiere, dicendogli di sentirsi di peso, poiché non riesce neppure a mangiare da solo. La strategia più appropriata che potrebbe usare l'infermiere è di:	mostrarsi non frettoloso, sedersi accanto al letto e incoraggiare il paziente a mangiare il più possibile	offrire al paziente prima tutti i cibi solidi e poi i liquidi	ridurre al minimo la conversazione, in modo che il paziente possa mangiare più rapidamente	alimentare il paziente, in modo che egli non ritenga di sottrarre troppo tempo	INFERMIERISTICA GENERALE
373	Si riporta il caso di un infermiere che sta preparando un farmaco per la somministrazione intramuscolare contenuto in un flaconcino. Quale dei seguenti è un passaggio errato?	Aspirare il farmaco e abbandonare la siringa preparata sul carrello per rispondere a un campanello	Controllare la prescrizione medica	Detergere il tappo del flaconcino con un tampone antisettico	Identificare il paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
374	In riferimento alla documentazione del processo di svuotamento della vescica sono accettabili tutti i termini tranne:	evacuazione	urinare	minzione	svuotamento	INFERMIERISTICA GENERALE
375	Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ rappresenta un fattore di rischio di malnutrizione".	La compromissione della deglutizione	La compromissione della mobilità	La stipsi	L'inconsistenza fecale	INFERMIERISTICA GENERALE
376	Il lavaggio delle mani, secondo quanto stabilito dalle raccomandazioni internazionali, si esegue:	prima e dopo il contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo l'esposizione a liquidi biologici e dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente	dopo l'esposizione a liquidi biologici, prima e dopo il contatto con pazienti infetti	quando le mani sono visibilmente sporche o potenzialmente infette	quando non si indossano i guanti	INFERMIERISTICA GENERALE
377	Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ sono considerati fattori predittivi del rischio caduta".	I problemi cognitivi, problemi nella deambulazione, contenzione, dolore	Il non corretto utilizzo ausili deambulazione, dolore, nicturia, presenza cannula venosa	L'abuso alcolico, contenzioso, calzature inadeguate, stipsi	L'incontinenza urinaria, disfagia, terapia farmacologica, deficit della vista	INFERMIERISTICA GENERALE
378	Quale alternativa di risposta contiene un'affermazione corretta riguardo il governo clinico e la gestione del rischio?	La gestione del rischio clinico è un elemento del governo clinico	Il governo clinico è una conseguenza delle attività di gestione del rischio clinico	Il governo clinico viene attuato dalle Direzioni Sanitarie, il rischio clinico viene gestito da tutti i Servizi	Il governo clinico e la gestione del rischio sono sinonimi	INFERMIERISTICA GENERALE
379	Considerare il caso in cui un paziente riferisce la presenza di dolore di intensità 6 con riferimento alla scala numerica 0-10. Viene prescritto dal medico un farmaco analgesico e qualche minuto dopo l'infermiere si appresta a somministrarlo. Nella stanza di degenza il paziente parla con i propri familiari e apparentemente non manifesta alcun sintomo legato al dolore. Quale affermazione è corretta, in riferimento al caso esposto?	Somministra il farmaco ugualmente anche se la distrazione ha avuto un ruolo importante sulla percezione del dolore	Non somministra il farmaco perché non essendoci alcun segno esteriore sicuramente il dolore è assente	Conserva il farmaco per quando il paziente riferirà un livello di dolore più intenso	Somministra il farmaco dopo aver verificato nuovamente l'intensità del dolore con i familiari	INFERMIERISTICA GENERALE
380	Cosa si esegue, per esprimere la prevalenza delle Lesioni da Decubito (LdD)?	Numero di pazienti con LdD/totale pazienti presenti x 100	Numero di pazienti con LdD acquisita in ospedale/totale pazienti presenti	Numero totale di LdD/ totale giornate di degenza x 100	Numero di pazienti con LdD/totale pazienti presenti	INFERMIERISTICA GENERALE
381	Si espone il caso di un paziente collaborante di 24 anni, con diabete di tipo I di nuovo riscontro. Tra gli altri obiettivi, vi è quello di educarlo alla corretta auto somministrazione dell'insulina, per via sottocutanea. Nella fase di valutazione dell'apprendimento, la tecnica più efficace è:	data dalle dimostrazioni ripetute della tecnica da parte del paziente	il questionario scritto per avere traccia dell'apprendimento	la check list da utilizzare durante una proiezione della procedura corretta	la simulazione di una situazione tipo da parte dell'infermiere	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

382	Il concetto di assistenza infermieristica definito dall'American Nursing Association (ANA) è:	la diagnosi e il trattamento delle risposte umane dei pazienti alla malattia	il trattamento delle diagnosi infermieristiche e dei problemi collaborativi	la risposta umana del paziente ai problemi dell'esistenza	la diagnosi e il trattamento delle malattie e delle reazioni psicologiche	INFERMIERISTICA GENERALE
383	Cosa descrive la seguente affermazione: " _____ consiste nell'aiutare il paziente e la sua famiglia a comprendere la malattia ed il trattamento, a collaborare alle cure, a farsi carico del proprio stato di salute ed a conservare e migliorare la propria qualità di vita".	La definizione che l'OMS dà all'educazione terapeutica	La definizione di assistenza infermieristica secondo la teorica H. Peplau	La definizione che l'OMS dà all'assistenza territoriale	La definizione che il Consiglio europeo dà all'assistenza psichica	INFERMIERISTICA GENERALE
384	Completare la frase con l'opzione corretta: "L'infermiere sta accogliendo in pronto soccorso una paziente di 66 anni, con scompenso cardiaco congestizio. Oltre ad altri sintomi, presenta ipokaliemia $k^{+}=2,9$. Potrebbe aver contribuito a determinare l'ipokaliemia il farmaco _____ assunto a domicilio dalla paziente".	Furosemide 50 mg / 2 cp die	Digossina 0.125 mg / 1 cp die	Pantoprazolo 20 mg / cp die	Clopidogrel 75 mg / 1 cp die	INFERMIERISTICA GENERALE
385	Che cosa richiede la randomizzazione, negli studi sperimentali?	L'assegnazione dei pazienti al gruppo degli esposti o al gruppo di controllo in modo occasionale, attraverso tavole	L'individuazione di un follow up che controlla gli effetti del trattamento (ad esempio uso del materasso ad acqua) a distanza di tempo	La precisa identificazione di criteri di inclusione e di esclusione del campione applicati a random sul campione selezionato	L'esecuzione dello studio in cieco: i pazienti non possono essere informati sull'intervento	INFERMIERISTICA GENERALE
386	Quale tra le seguenti azioni indica un comportamento errato durante un trattamento emotrasfusionale?	In caso di reazione trasfusionale cercare e avvertire immediatamente il medico e sospendere la trasfusione togliendo la sacca e l'ago cannula	Verificare che cognome e nome del paziente riportati sulla unità di emocomponente corrispondano all'identità del paziente da trasfondere, come da cartella clinica, consenso informato e richiesta	Verificare che il gruppo sanguigno del ricevente, come riportato nella documentazione rilasciata dalla struttura trasfusionale, sia compatibile con il gruppo sanguigno indicato sull'etichetta dell'emocomponente da trasfondere	Per i primi 15 minuti infondere il sangue lentamente e monitorare costantemente i parametri vitali, di seguito continuare il monitoraggio ogni 20 minuti	INFERMIERISTICA GENERALE
387	Quale tra quelli proposti NON sono sintomi caratteristici dell'ipoglicemia?	Ipertermia e diarrea	Polso frequente, vista sfocata o sdoppiata, debolezza	Sudorazione, fame, tremore	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
388	In riferimento al processo di trasferimento delle consegne, quale opzione di risposta contiene il gruppo di raccomandazioni da trasferire che risulta più esaustivo nel garantire la sicurezza del paziente?	Frequenza monitoraggio, cardiovascolare, presenza infezioni, livello di rischio lesioni, livello di rischio caduta, rischio malnutrizione	Alterazioni della comunicazione, presidi utilizzati, diagnosi medica, risultati esami di laboratorio, prenotazione esami diagnostici	Presenza infezioni, diagnosi medica, frequenza monitoraggio cardiovascolare, livello di rischio caduta, risultati esami di laboratorio	Diagnosi medica, frequenza monitoraggio cardiovascolare, presenza infezioni, livello di rischio lesioni, livello di rischio caduta	INFERMIERISTICA GENERALE
389	Si espone il caso in cui, in casa di riposo, viene riammesso un ospite che ha subito un intervento ortopedico a seguito di una caduta accidentale. La lettera di trasferimento prevede un regime terapeutico analgesico che è confermato dal medico della struttura. Nel garantire la corretta esecuzione del trattamento, quale opzione di risposta è errata?	E' importante somministrare la minor quantità di farmaco possibile al fine di conservarne per quando il dolore sarà maggiore	E' meglio somministrare il farmaco analgesico ad intervalli regolari, prestabiliti da una scheda piuttosto che al bisogno	I trattamenti non farmacologici (massaggi, caldo/freddo, rilassamento) possono ridurre efficacemente il dolore per brevi periodi di tempo	E' importante rilevare il dolore del paziente ad intervalli prestabiliti usando strumenti per l'oggettivazione dello stesso (scala numerica, scala visiva, ...)	INFERMIERISTICA GENERALE
390	Nel caso in cui un infermiere sia in dubbio se il prelievo capillare per stick glicemico possa essere affidato all'operatore socio sanitario, quale fonte può trovare di utile riferimento per un chiarimento?	Conferenza Stato-Regioni, seduta del 22 febbraio 2001	DPR n. 225/1974 Titolo V	DPR n. 1310/1940 e legge n. 42/1999, art. 6	DM n. 739/1994	INFERMIERISTICA GENERALE
391	Se sfogliando il manuale della qualità del reparto si legge la frase "Riconoscimento pubblico del possesso dei requisiti previsti dagli standard nazionali/regionali per i potenziali erogatori di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale/regionale" si tratta di:	accreditamento istituzionale	certificazione ISO 9000	accreditamento volontario	accreditamento JACHO	INFERMIERISTICA GENERALE
392	"professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'art. 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270": Questa affermazione corrisponde:	a un estratto della legge n. 43/2006	a un estratto della legge n. 42/1999	a due commi del d.m. n. 739/1994	a un estratto del Codice deontologico	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

393	"Sono infermiere della stroke unit e lavoro in questo modo: accolgo i bisogni dei pazienti affidati. Alle 7.00 inizio le terapie, mentre l'OSS distribuisce la colazione ai 10 pazienti. Poi l'OSS assieme ad un collega effettuano l'igiene dei pazienti mentre io procedo con il giro visita del medico": in base a questa affermazione, quale modello organizzativo adotta l'infermiere nella sua pratica?	Per funzioni	Per case management	Per team leader	Per primary nurse	INFERMIERISTICA GENERALE
394	Completare la frase con l'opzione corretta: "Tra le seguenti condizioni il _____ espone maggiormente un paziente allo sviluppo di Lesioni da Decubito".	BMI 15, disidratazione, incontinenza, immobilità	BMI 25, immobilità, incontinenza	BMI 26, anemia, immobilità, incontinenza	BMI 22, immobilità, stipsi	INFERMIERISTICA GENERALE
395	Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ non appartiene alla categoria delle soluzioni di elettroliti concentrati".	Il cloruro di sodio (NaCl) 0,9%	Il cloruro di potassio (KCl) 2 mEq/ml	Il fosfato di potassio (K ₃ PO ₄) 1 mEq/ml	Il fosfato di potassio (K ₃ PO ₄) 2 mEq/ml	INFERMIERISTICA GENERALE
396	La guarigione per seconda intenzione delle ferite:	È il processo di guarigione in cui comincerà dal fondo della ferita con un tessuto di granulazione che procederà risalendo verso l'alto fino a raggiungere lentamente la superficie	È un processo tipico delle ferite chirurgiche, molto lento e suscettibile di infezioni	È una caratteristica che può interessare le ferite lacero contuse e raramente si complica in processi infettivi	Interessa prevalentemente le ferite da ustione ed esita in una cicatrice minima	INFERMIERISTICA GENERALE
397	In una persona non cosciente se le vie aeree sembrano ostruite dopo il primo tentativo di ventilazione, il soccorritore deve:	Riposizionare il capo e provare a ventilare	Iniziare le compressioni toraciche	Posizionare il paziente in posizione laterale	Proseguire nella sequenza con la ventilazione	INFERMIERISTICA GENERALE
398	Quando si pianifica una sessione di educazione ad un paziente vi sono diversi fattori da prendere in considerazione. La paziente ha 65 anni e verrà dimessa con ilostomia, il decorso post-intervento è nella norma. Indicare la situazione maggiormente appropriata:	L'assistita è sveglia da 2 ore, sono le 17.00, è in poltrona da 10 minuti. Informo che la durata della sessione è di 20 minuti, la dimissione è programmata tra 2 giorni, è presente il marito	L'assistita è sveglia da 2 ore, sono le 17.00, è in poltrona da 10 minuti. Informo che la durata della sessione è di 20 minuti, è stata informata che dovrà fare una TAC di controllo tra 40 minuti. La dimissione è programmata tra 2 giorni, sono presenti il marito e la figlia	L'assistita è sveglia da 2 ore, sono le 17.00, è in poltrona da 10 minuti. Informo che la durata della sessione è di 20 minuti, la dimissione è programmata tra 2 giorni. Il familiare si è dovuto assentare	L'assistita è sveglia da 15 minuti, solo le 17.00, verrà messa in poltrona. Informo che la durata della sessione è di 50 minuti, la dimissione è programmata tra 2 ore, è presente un amico che non vive con la signora	INFERMIERISTICA GENERALE
399	Il Piano Sanitario Nazionale ha durata:	Triennale	Biennale	Quadriennale	Quinquennale	INFERMIERISTICA GENERALE
400	Di norma il primo segno di disidratazione nel paziente anziano è :	La secchezza della bocca	La secchezza delle mucose comprese quelle dell'occhio	L'affaticamento	Il mal di testa	INFERMIERISTICA GENERALE
401	La più importante conseguenza a seguito della somministrazione di un unico dosaggio eccessivo di benzodiazepine può essere:	Depressione del respiro	Dipendenza psicologica	Ipertonia muscolare	Tutte le precedenti	INFERMIERISTICA GENERALE
402	Indicare la descrizione più completa e corretta nel definire le caratteristiche della Lesione da Decubito di 3° stadio.	Sede: sacrale. Dimensioni: 20 nmm x 35mm. Fondo: granulazione. Essudato: scarso. Bordo: arrossato. Cute circostante macerata. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi fino alla fascia muscolare senza attraversarla; la lesione si presenta clinicamente come una profonda cavità che può presentare dei tratti sotto minati	Sede: sacrale. Dimensioni: 2 mm x 35mm. Fondo: granulazione. Essudato: scarso. Bordo: arrossato. Cute circostante macerata. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi fino alla fascia muscolare senza attraversarla; la lesione si presenta clinicamente come una profonda cavità che può presentare dei tratti sotto minati	Sede: trocantere sinistro. Dimensioni: 20 mm x 35mm. Fondo: granulazione. Essudato: scarso. Bordo: arrossato. Cute circostante integra. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma (abrasione, vescicola o cratere)	Sede: sacrale. Dimensioni: 20 nmm x 35mm. Fondo: flittente. Essudato: abbondante. Bordo: lineare. Cute circostante macerata. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi fino alla fascia muscolare senza attraversarla; la lesione si presenta clinicamente come una profonda cavità che può presentare dei tratti sotto minati	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

403	Nella fase di accertamento infermieristico al paziente che all'atto del ricovero è valutato come potenzialmente disfagico, si applica lo screening della deglutizione. Per valutare la deglutizione si somministrano piccole quantità di acqua gel. In seguito, si riscontra nel paziente l'alterazione della qualità della voce e la comparsa di tosse. Indicare l'intervento più adeguato.	Non somministrare nulla per bocca e richiedere il consulto del medico per considerare il supporto nutrizionale artificiale	Attendere che il sintomo passi a riperesere la valutazione della deglutizione	Eseguire un ulteriore test di deglutizione con piccole quantità di acqua di rubinetto	Mettere il paziente in posizione di sicurezza e avvisare tempestivamente il servizio di Rianimazione	INFERMIERISTICA GENERALE
404	Se si utilizza l'operazione booleano OR nel seguente modo "lesione OR ferita" si ottiene:	Una lista di pagine che contengono la parola lesione o la parola ferita o entrambe	Una lista di pagine che contengono la parola lesione e non la parola ferita	Una lista di pagine che contengono la parola ferita e non la parola lesione	Una lista di pagine che non contengono entrambe le parole	INFERMIERISTICA GENERALE
405	In presenza di una persona con ipoglicemia grave con perdita di conoscenza, quale dei seguenti farmaci bisogna preparare perché con ogni probabilità verrà prescritto:	Glucagone per via intramuscolare	Furosemide per via endovenosa	Atropina per via sottocutanea	Adrenalina per via endoversa	INFERMIERISTICA GENERALE
406	Nell'ambito della valutazione della qualità, il confronto tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente raggiunti esprime:	L'efficacia	L'economicità	L'efficienza	L'appropriatezza	INFERMIERISTICA GENERALE
407	La formulazione completa della diagnosi infermieristica comprende:	Il titolo diagnostico, il fattore correlato e le caratteristiche definenti	Il titolo diagnostico, il fattore correlato ed i sintomi soggettivi	Il titolo diagnostico, la diagnosi medica e i dati delle indagini strumentali	Il problema di salute percepito dal paziente, la causa ed i sintomi	INFERMIERISTICA GENERALE
408	"Il paziente ha una dipendenza totale nelle Activities of Daily Living (ADL); i paramentri sono buoni. È in fase di dimissione e presso il suo domicilio è previsto il mantenimento dell'ossigeno terapia con occhialini e bombola". In base ai dati disponibili:	L'igiene a letto può essere attribuita all'OSS	L'igiene a letto deve essere effettuata da un infermiere ed un OSS	L'igiene a letto deve essere effettuata dall'infermiere	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
409	Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ attribuisce valore giuridico al Codice Deontologico"	La legge n. 42/1999	La legge n. 1/2002	Il D.P.R. n. 255/1974	Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro	INFERMIERISTICA GENERALE
410	Indicare i segni e sintomi più corretti da valutare nella fase di accertamento in un paziente affetto da cirrosi epatica scompensata.	Valutazione aspetto cognitivo (orientamento temporo-spaziale, difficoltà di concentrazione); presenza di edemi declivi; ascite; presenza di emorragia (ematemesi/melena); stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori)	Valutazione aspetto cognitivo (orientamento temporo-spaziale, difficoltà di concentrazione); presenza di edemi declivi; ascite; valutazione stato nutrizionale e idratazione; stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori)	Valutazione aspetto cognitivo (orientamento temporo-spaziale, difficoltà di concentrazione); pressione venosa centrale, ascite; presenza di emorragia (ematemesi/melena); stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori)	Valutazione dei parametri vitali (pressione, frequenza); presenza di edemi declivi; ascite; presenza di emorragia (ematemesi/melena); stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori)	INFERMIERISTICA GENERALE
411	La segnalazione degli eventi avversi (Incident Reporting) prevede l'indicazione dei fattori che possono aver contribuito all'evento. Indicare il gruppo di fattori più corretto.	Mancata adesione del paziente al progetto terapeutico, inadeguate conoscenze del personale, inadeguato funzionamento attrezzature	Mancata adesione del paziente al progetto terapeutico, variazione improvvisa dei parametri vitali del paziente, attrezzature eccessivamente sofisticate	Complessità della terapia, personale non qualificato, inadeguato funzionamento attrezzature	Barriere linguistiche del paziente, gruppo multidisciplinare, attrezzature eccessivamente sofisticate	INFERMIERISTICA GENERALE
412	Viene ricoverato dal pronto soccorso un paziente maschio di 18 anni, presente sudorazione, tremore, palpitazioni, debolezza generale, glicemia 65 mg/dl, riferisce nelle ultime due settimane polidipsia e poliuria, aumento dell'appetuto e perdita peso > 20% negli ultimi 2 mesi. Il sospetto diagnostico protrebbe essere:	Diabete di tipo I	Diabete di tipo II	Diabete insipido tipo I e II	Probabilmente è affaticato da un'intensa attività fisica	INFERMIERISTICA GENERALE
413	Completare la frase con l'opzione corretta: "La _____ non è un parametro incluso nellla Glasgow Coma Scale"	Termoregolazione	Risposta verbale	Apertura occhi	Risposta motoria	INFERMIERISTICA GENERALE
414	In una struttura residenziale, si vuole progettare uno strumento di monitoraggio della disidratazione negli anziani da attivare nel periodo estivo. Per individuare in letteratura i segni/sintomi maggiormente predittivi di disidratazione, quale tra i seguenti quesiti riflette in maniera più corretta la metodologia PICO per ricercare la letteratura su MedLine:	Nella popolazione anziana istituzionalizzata, quali sono i segni/sintomi predittivi di disidratazione?	In casa di riposo, quali strumenti sono più efficaci per il monitoraggio della disidratazione?	È più a rischio di disidratazione la popolazione anziana istituzionalizzata o quella gestita a domicilio da un infermiere di comunità?	È più efficace la somministrazione di infusioni per via intradermica o per via endovenosa nella prevenzione della disidratazione degli anziani?	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

415	Le principali complicanze croniche del diabete mellito sono:	Neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, retinopatia diabetica, malattie cario vascolari, piede diabetico, complicanze in gravidanza	Coma ipoglicemico, neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, glaucoma	Infarto, scompenso cardiaco, ictus, piede diabetico, coma chetoacidotico	Coma ipoglicemico, glaucoma, infarto, scompenso cardiaco	INFERMIERISTICA GENERALE
416	Le cure palliative sono rivolte:	Sia alla persona malata che alla sua famiglia per la cura attiva e totale, quando la malattia di base è contraddistinta da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta che non risponde più a trattamenti specifici	Esclusivamente a pazienti con patologie nefrologiche	Esclusivamente a pazienti con patologie oncologiche	Esclusivamente a pazienti oncologici che hanno terminato la chemioterapia	INFERMIERISTICA GENERALE
417	Con l'allattamento materno esclusivo si intende:	Solo latte materno senza alcuna aggiunta	Solo latte materno e acqua	Solo latte materno e soluzione glucosata	Solo latte materno ed elettrolitica	INFERMIERISTICA GENERALE
418	Per screening si intende:	Un percorso (con test e/o esami strumentali) condotto a tappeto su una fascia più o meno ampia della popolazione, allo scopo di individuare una patologia o ancora meglio i suoi prodromi, prima che si manifesti con i sintomi	Un percorso (con test ed esami strumentali) condotto su una fascia di popolazione particolarmente a rischio per una determinata patologia	Un test per valutare il quoziente intellettivo	Un percorso (con test e/o esami strumentali) condotto su tutta la popolazione che presenta lo stesso sintomo, riconducibile ad una particolare patologia	INFERMIERISTICA GENERALE
419	Il respiro di Cheyne-Stokes è contraddistinto da:	Respiri profondi alternati a brevi periodi di apnea	Frequenza cardiaca a 80 atti al minuto	Frequenza respiratoria inferiore a 20 atti al minuto	Frequenza respiratoria superiore a 12 atti al minuto e respiro profondo	INFERMIERISTICA GENERALE
420	Completare la frase con l'opzione corretta: " Il _____ può configurare ipotesi di responsabilità professionale colposa"	Comportamento negligente, imprudente, imperito	Mancato rispetto dei regolamenti e delle procedure aziendali	Mancato rispetto del codice deontologico	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
421	Nella valutazione dello screening nutrizionale può essere applicata la scala:	MNA (Mini nutritional assessment)	Di Barthel	Di Painad	Di Tinetti	INFERMIERISTICA GENERALE
422	In caso si ostruzione parziale delle vie aeree la manovra di Heimlich:	Non deve essere praticata	Deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza	Deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente	Deve essere praticata sempre	INFERMIERISTICA GENERALE
423	Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere"	Il lavaggio delle mani	La dotazione di antibiotici	Il ricambio quotidiano della biancheria del letto	La dotazione di disinfettanti	INFERMIERISTICA GENERALE
424	Le norme d'uso del registro di carico-scarico delle sostanze stupefacenti identificano nel Coordinatore Infermieristico:	Il responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti	Colui che accerta, attraverso periodiche ispezioni, la corretta tenuta del registro di carico e scarico del reparto	L'incaricato della buona conservazione del registro	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
425	Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ causano l'insufficienza renale cronica (IRC)"	Tutte le altre risposte sono corrette	Le malattie nefrovascolari	Le glomerulonefriti	Il diabete	INFERMIERISTICA GENERALE
426	Al fine della preparazione dei set chirurgici, i ferri chirurgici devono essere sottoposti alle fasi del processo seguenti:	Decontaminazione-disinfezione-sterilizzazione	Sterilizzazione-disinfezione-sanificazione	Disinfezione-decontaminazione-sterilizzazione	Sterilizzazione-decontaminazione-disinfezione	INFERMIERISTICA GENERALE
427	Per sterilizzazione si intende:	Un processo atto alla distruzione di tutti i microorganismi patogeni, non patogeni e spore comprese	Un processo atto all'abbassamento della carica microbica da oggetti e superfici	Un processo atto alla distruzione dei soli microorganismi patogeni	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
428	Il rilievo della pressione dell'arteria polmonare è possibile soltanto:	Attraverso il catetere di Swan Ganz o similari	Negli interventi di cardiocirurgia e chirurgia toracica	Con una particolare apparecchiatura denominata IABP	Attraverso la sonda Sengstaken-Blakemore	INFERMIERISTICA GENERALE
429	Il Caregiver è:	Colui che fornisce assistenza e si prende cura di una persona non in grado di prendersi cura di sé	L'infermiere che si prende cura del paziente durante il periodo di degenza	Il medico di Medicina generale che si prende cura del suo assistito	Il fisioterapista che ha in carico l'assistito	INFERMIERISTICA GENERALE
430	La raccomandazione n.8 del Ministero della salute per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari ricorda che tali episodi sono favoriti da:	Lunghe attese nelle zone di emergenza e accettazione che favoriscono sensazioni di frustrazione nell'utenza	Assenza di linee guida	Continuo ricambio del personale sanitario	Assenza di procedure professionali	INFERMIERISTICA GENERALE
431	Le fiali di KCL devono essere conservate:	In un apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco pericoloso"	Chiuse a chiave nella cassaforte degli "stupefacenti"	Assieme ai farmaci per uso parentale	Assieme ai farmaci per uso orale	INFERMIERISTICA GENERALE
432	Completare la frase con l'opzione corretta: "L'infermiere si aspetta di trovare il batterio _____ alle analisi di laboratorio per un paziente in cui si sospetta la patologia dell'ulcera peptica"	Helicobacter pylori	Micrococcus	Corynebacterium	Staphylococcus Aureus	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

433	Un paziente riferisce bruciore durante la minzione e aumentata frequenza minzionale. L'infermiere nota che un campione di urina sterile è torbida. Questi segni e sintomi sono dovuti a:	Cistite	Calcolo renale	Emorragia	Incontinenza	INFERMIERISTICA GENERALE
434	Tenere un sacchetto di drenaggio per catetere di tipo Foley in una posizione più bassa rispetto alla vescica previene:	Il reflusso urinario	La ritenzione urinaria	L'incontinenza riflessa	L'incontinenza urinaria	INFERMIERISTICA GENERALE
435	La quantità di sangue da prelevare per ogni campione di emocoltura è di:	20 cc	1 cc	3-4 cc	5-10 cc	INFERMIERISTICA GENERALE
436	Durante la notte un paziente presenta uno stato confusionale acuto e tenta di rimuoversi più volte la cannula tracheostomica. Il medico di guardia è impegnato per un'urgenza. L'infermiere:	Applica e documenta in cartella infermieristica la contenzione fisica, in quanto sussiste un reale pericolo per il paziente. Quindi lo monitora e attende l'arrivo del medico di guardia per discutere il caso	Contatta il parente più prossimo da cui acquisisce il consenso telefonico per la contenzione fisica	Attende il medico di guardia, sperando che il paziente non si rimuova la cannula. Non può intraprendere alcuna decisione in autonomia	Applica la contenzione farmacologica a basse dosi secondo il protocollo previsto dalla unità operativa	INFERMIERISTICA GENERALE
437	Per effettuare un'iniezione intramuscolare in un bambino di 10 mesi, l'infermiere sceglie la:	Sede del vasto laterale	Sede ventrogluteale	Sede dorsogluteale	Sede deltoidea	INFERMIERISTICA GENERALE
438	Nell'aspirazione di un farmaco da flacone, l'infermiere inietta aria all'interno:	In quanto crea pressione positiva rendendo più facile l'aspira	In nessun caso per l'elevato rischio di contaminazione	Solo per i farmaci viscosi	In nessun caso in quanto si crea pressione negativa e risulterebbe più difficoltoso aspirare	INFERMIERISTICA GENERALE
439	Il medico, durante la visita, prescrive il posizionamento di gambaletti elastocompressivi antitrombo di I° a un paziente. Per ottenere la giusta misura delle calze l'infermiere rileva la:	Misura della lunghezza di entrambe le gambe, dal tallone alla zona poplitea, e misura della circonferenza del polpaccio nel punto più largo	Misura della lunghezza della gamba destra dal tallone alla zona poplitea e misura della circonferenza del polpaccio nel punto più ampio	Misura della lunghezza di entrambe le gambe dal tallone alla zona poplitea	Misura della circonferenza del polpaccio nel punto più largo	INFERMIERISTICA GENERALE
440	Per la ricerca del sangue occulto fecale sono necessari:	1 campione	4 campioni, uno per ogni diversa evacuazione	3 campioni prelevati dalla stessa defecazione	2 campioni, uno per ogni diversa defecazione	INFERMIERISTICA GENERALE
441	È in preparazione il trasferimento di un paziente presso il reparto di Malattie infettive per tubercolosi polmonare in fase attiva. Cosa bisogna predisporre:	Camera di isolamento respiratorio a pressione negativa continua	Camera di isolamento respiratorio a pressione positiva intermittente	Camera di isolamento respiratorio a pressione positiva continua	Camera di isolamento respiratorio a pressione negativa intermittente	INFERMIERISTICA GENERALE
442	All'ingresso della stanza di degenza di un paziente con tubercolosi polmonare in fase attiva si dovranno predisporre:	Guanti, sovracamici, mascherine chirurgiche, scgermi facciali, maschere filtranti	Maschere filtranti	Maschere chirurgiche e guanti	Maschere filtranti e mascherine chirurgiche	INFERMIERISTICA GENERALE
443	In reparto due pazienti ricoverati nella stessa stanza risultano positivi al C. Difficilis. L'infermiere:	Predisporre le misure di isolamento funzionale, mantenendo i pazienti nella stessa stanza	Predisporre le misure di isolamento funzionale e spostare i pazienti in due stanze diverse	Mantiene i pazienti nella stessa stanza senza predisporre i DPI	Sposta i pazienti in due diverse stanze con bagno in comune	INFERMIERISTICA GENERALE
444	L'infermiere deve somministrare soluzione fisiologica 2.000 ml in 24 ore. Bisogna impostare il dispositivo di gocciolamento controllato alla velocità di quanti ml/h?	83	104	62	50	INFERMIERISTICA GENERALE
445	In caso di richiesta medica per "Indici di flogosi", vengono prescritti i seguenti esami ematici, eccetto:	Proteinuria	VES	PCR	Emocromo con formula	INFERMIERISTICA GENERALE
446	In un paziente con ileostomia, le feci fuoriescono:	Liquide	Solide	Acoliche	Miste a muco	INFERMIERISTICA GENERALE
447	Il digiuno nelle 6-8 ore precedenti deve essere predisposto nella procedura diagnostica:	TC torace con mezzo di contrasto	RX torace	EGA	MOC	INFERMIERISTICA GENERALE
448	Per la detersione di una colostomia si utilizza:	Soluzione fisiologica 0,9%	Acqua e sapone neutro	Iodio Povidone	Clorexidina 0,2%	INFERMIERISTICA GENERALE
449	Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ è opportuno effettuarlo al mattino"	Lo Scotch test	L'indice di flogosi	L'EGA	Il prelievo per l'emocoltura	INFERMIERISTICA GENERALE
450	Per ridurre l'edema in un arto superiore si deve posizionare la:	Mano più alta del gomito, il gomito più alto della spalla	Mano più alta del gomito	Mano più alta del polso	Mano più alta del gomito in posizione semiseduta	INFERMIERISTICA GENERALE
451	Un paziente cade dal letto mentre tenta di spostarsi in autonomia sulla sedia, non riportando danni evidenti. L'infermiere:	Avverte il medico, e invia la segnalazione alla Direzione sanitaria/Gestione del rischio clinico, documentando l'accaduto ain cartella	Non avverte il medico e accompagna il paziente nuovamente a letto, alzando le spondine	Non avverte il medico, ma posiziona una pettoruna contenitiva per il periodo in cui il paziente rimane seduto sulla sedia	Avverte il medico, ma non invia la segnalazione alla Direzione sanitaria/Gestione del rischio clinico	INFERMIERISTICA GENERALE
452	Un paziente ricoverato presenta abbondante essudato giallastro maleodorante nella lesione cutanea. L'infermiere applica:	Una medicazione all'argento più prelievo tampone da inviare in microbiologia	Una garza betadinata	Una medicazione idrocolloide	Una garza betadinata più prelievo tampone da inviare in microbiologia	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

453	Nel reparto di Terapia intensiva sono aumentati i casi di infezione delle vie respiratorie nei pazienti ricoverati. L'infermiere deve:	Porre maggiore attenzione all'igiene del cavo orale	Porre maggiore attenzione all'igiene personale	Broncoaspirare tutti i pazienti almeno due volte per turno	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
454	Completare la frase con l'opzione corretta: " In caso di dimissione difficile, è utile somministrare la _____ per agevolare l'équipe multidisciplinare nella pianificazione di una continuità assistenziale di cura sul territorio"	Scala BRASS	Scala di Conley	Scala ReTos	Scala di Barthel	INFERMIERISTICA GENERALE
455	Completare la frase con l'opzione corretta: "La figura del _____ non fa parte del Servizio di igiene e sanità pubblica"	Infermiere generico	Tecnico	Medico igienista	Assistente sanitario	INFERMIERISTICA GENERALE
456	L'elettroshock può essere somministrato con:	Consenso scritto del paziente e presenza di indicazioni terapeutiche	Consenso della famiglia e assenza di controindicazioni	Richiesta espressa del tutore e presenza di indicazioni terapeutiche	Fallimento di altre terapie e pericolosità sociale del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
457	La tossina prodotta dal clostridium botulinum provoca manifestazioni a carico del:	Sistema nervoso	Sistema linfatico	Fegato	Rene	INFERMIERISTICA GENERALE
458	L'agopuntura e la fitoterapia possono essere esercitate:	Solo da medici abilitati	Solo da operatori abilitati con corsi professionali	Anche da infermieri e ostetriche specializzati	Anche da terapisti di varie categorie	INFERMIERISTICA GENERALE
459	Il campo proprio di esercizio e responsabilità di un professionista è descritto nel:	Profilo professionale	Codice deontologico	Contratto di lavoro	Codice civile dell'impiegato	INFERMIERISTICA GENERALE
460	In base alla legge n. 180/1978 le persone affette da malattia mentale:	Devono essere ricoverate in un ospedale generale, in servizi specifici	Devono essere seguite da personale appositamente preparato	Devono essere ricoverate in un ospedale specializzato	Possono essere ricoverate per non meno di venti giorni	INFERMIERISTICA GENERALE
461	L'attività dei disinfettanti chimici è in genere ridotta:	Dalla presenza di materiale organico	Dalla presenza di spore	Dalla bassa temperatura ambientale	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
462	Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ può essere utilizzato per gli strumenti endoscopici"	La glutaraldeide	La paraformaldeide	Il sale di ammonio quaternario	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
463	Indicare l'affermazione errata rispetto alla sedazione terminale e palliativa (SICP,2006):	Comprende anche un approccio con terapia ansiolitica	Consiste nella riduzione della vigilanza con mezzi farmacologici per il controllo del sintomo refrattario	Non comprende la sedazione occasionale	La perdita di coscienza non è l'aspetto primario, ma solo l'effetto collaterale del farmaco	INFERMIERISTICA GENERALE
464	Una persona, stando in piedi su una base instabile, migliora le sue condizioni di equilibrio quando:	Flette e allarga le gambe	Tiene le gambe strette	Flette le gambe	Allarga le gambe	INFERMIERISTICA GENERALE
465	Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ costituisce un rischio specifico da considerare in caso si fibrillazione atriale, anche se sottoposta a cardioversione"	La tromboembolia arteriosa	L'arresto cardiaco improvviso	L'extrasistolia notturna	L'ustione da scarica elettrica	INFERMIERISTICA GENERALE
466	Per uniformare le procedure relative ad una tecnica (es. cateterismo vescicale) all'interno dell'équipe è opportuno utilizzare:	Protocolli assistenziali	Consegna	Cartella Infermieristica	Passaparola	INFERMIERISTICA GENERALE
467	Quali sono tutte le fasi del processo assistenziale?	Informativa, organizzativa, esecutiva, valutativa	Informativa, organizzativa, esclusiva	Informativa, di complicità, organizzativa	Informativa, dissociativa, inclusiva, contestativa	INFERMIERISTICA GENERALE
468	Qual è la prima fase del processo assistenziale?	La fase informativa	La fase organizzativa	La fase valutativa	La fase dissociativa di intervento	INFERMIERISTICA GENERALE
469	Nell'ambito del nursing, secondo Florence Nightingale:	intervenire sull'ambiente e sull'igiene contribuisce al benessere dell'uomo	l'ambiente non ha nessuna correlazione con il benessere dell'uomo	gli antibiotici sono gli unici elementi che possono contribuire al benessere dell'uomo	il lavoro di équipe è controproducente	INFERMIERISTICA GENERALE
470	L'empiema è una raccolta di:	Pus in una cavità preformata	Pus in una cavità neoformata	Sangue in una cavità preformata	Sangue in una cavità neoformata	INFERMIERISTICA GENERALE
471	La FIVET è:	Una tecnica di riproduzione assistita	Una malattia esantematica	Una tecnica di biologia molecolare	Una malformazione cardiaca congenita	INFERMIERISTICA GENERALE
472	Le scale EWS (Early Warning Score) misurano:	L'instabilità/ degrado dei parametri vitali del paziente	Il rischio di infezione catetere venoso correlato	La complessità assistenziale	Il grado di dispnea nel paziente BPCO	INFERMIERISTICA GENERALE
473	Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza?	Trombosi	Setticemia	Pneumotorace	Flebite	INFERMIERISTICA GENERALE
474	Nel suo testo "From Novice to Expert" è stata trattata l'analisi della socializzazione e l'acquisizione delle abilità della professione infermieristica. Questa affermazione si riferisce a:	Patricia Benner	Callista Roy	Nancy Roper	Martha Roger	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

475	Quale tra i seguenti antibiotici appartiene alla famiglia di macroliti?	Eritromicina	Amikacina	Gentamicina	Tobramicina	INFERMIERISTICA GENERALE
476	Quale tra i seguenti farmaci è generalmente indicato per indurre il parto a termine?	Ossitocina	Combinazione di ergonovina e indometacina e molta acqua	Ergonovina	Indometacina	INFERMIERISTICA GENERALE
477	La minzione avviene quando:	I muscoli pelvici si rilassano e i muscoli addominali si contraggono	Il sistema simpatico attivato stimola lo sfintere interno	Il filtrato glomerulare entra nei tubuli	L'aumento della pressione stende il muscolo detrusore	INFERMIERISTICA GENERALE
478	L'iperplasia di un organo o di un tessuto consiste nell'aumento:	Del numero di cellule	Del contenuto idrico cellulare	Del volume cellulare	Del contenuto ematico cellulare	INFERMIERISTICA GENERALE
479	Cosa sono i farmaci LASA?	Farmaci che possono essere confusi con altri	Farmaci equivalenti	Farmaci per uso compassionevole	Farmaci galenici	INFERMIERISTICA GENERALE
480	La "regola delle 7 G" nella somministrazione di un farmaco NON prevede:	Giusta trascrizione	Giusto dosaggio	Giusta prescrizione	Giusta registrazione	INFERMIERISTICA GENERALE
481	Cosa si intende per infezioni crociate ospedaliere?	Infezioni che si originano e si diffondono all'interno di un singolo ospedale	Infezioni per le quali è necessario il ricovero ospedaliero	Infezioni che non si sviluppano in ospedale	Infezioni che si verificano in più ospedali di una stessa città contemporaneamente	INFERMIERISTICA GENERALE
482	La sincope causata da sforzi estremi o paura è classificata come:	Sincope vasovagale	Sincope da ipotensione ortostatica	Sincope cardiaca	Sincope del seno carotideo	INFERMIERISTICA GENERALE
483	Per la stratificazione della severità del quadro clinico di quale patologia è utilizzata la classificazione NYHA?	Insufficienza cardiaca	BPCO	Infarto miocardico	Cirrosi epatica	INFERMIERISTICA GENERALE
484	L'atteggiamento di caring è:	Proprio dei professionisti che operano in campo socio sanitario e in altri campi	Esclusivo della professione infermieristica	Esclusivo degli psicologi	Esclusivo dei professionisti che operano in campo socio sanitario	INFERMIERISTICA GENERALE
485	Quale delle seguenti condizioni di per sé NON rappresenta un'indicazione sufficiente ad orientare la decisione per l'adozione di un cateterismo vescicale a permanenza?	Mobilità compromessa	Ricorrente ritenzione urinaria	Incontinenza in presenza di lesioni da pressione	Interventi chirurgici con anestesia generale	INFERMIERISTICA GENERALE
486	Per eminegligenza si intende una condizione dovuta a:	Una compromissione delle risposta sensoriale e motoria, della rappresentazione mentale e dell'attenzione spaziale corporea e dell'ambiente caratterizzata da una inattenzione verso una parte del corpo e una iperattenzione verso l'altra	Nessuna delle altre risposte è corretta	Una compromissione delle motoria e dell'attenzione spaziale corporea e dell'ambiente caratterizzata da una maggiore attenzione verso una parte del corpo rispetto all'altra	Una compromissione delle risposta sensoriale e motoria di un emisoma	INFERMIERISTICA GENERALE
487	La causa di danno più frequente nei pazienti ospedalizzati sono:	le terapie farmacologiche	gli interventi chirurgici	le procedure ostetriche e ginecologiche	le procedure mini invasive	INFERMIERISTICA GENERALE
488	L'intubazione orotracheale rispetto a quella nasotracheale:	presenta un minor rischio di infezione dei seni paranasali	presenta maggiore tollerabilità	nessuna delle altre risposte è corretta	garantisce maggiore stabilità	INFERMIERISTICA GENERALE
489	L'accertamento di morte cerebrale prevede un periodo di osservazione pari a:	6 ore	12 ore	20 minuti con ECG	6 ore negli adulti, 12 ore nei bambini tra 1 e 5 anni e 24 ore nei bambini < 1 anno	INFERMIERISTICA GENERALE
490	Per favorire la cicatrizzazione del moncone ombelicale è necessario tenere:	il moncone rivolto verso l'alto, fuori dal pannolino, avvolto in una garza sterile e fissato con rete elastica	il moncone al di sotto del pannolino rivolto verso il basso e non esposto all'aria	il moncone imbevuto di soluzione fisiologica per evitare la disidratazione che ritarda la cicatrizzazione	avvolto in garza sterile, imbevuta di soluzione iodata per facilitare l'essiccazione	INFERMIERISTICA GENERALE
491	Devi predisporre il bilancio idrico in un paziente con scompenso cardiaco a domicilio, quali sono gli interventi più completi e pertinenti:	Controllo del peso giornaliero, controllo dei parametri vitali, registrazione dei liquidi in entrata ed uscita	Controllo nutrizionale metabolico e registrazione dei liquidi in entrata ed uscita	Nessuna delle altre risposte è corretta	Somministrazione dieta iposodica e controllo del peso corporeo due volte a settimana	INFERMIERISTICA GENERALE
492	Devi procedere nella medicazione di una ferita chirurgica settica. Quale delle seguenti è la procedura corretta:	Procedere dalla parte più pulita alla parte più sporca della ferita mantenendosi sopra la ferita stessa. Cambiare tampone per disinfettare altre zone della cute	Procedere dalla parte più spora alla parte più pulita della ferita mantenendosi sopra la ferita stessa. Disinfettare altre zone della cute	Disinfettare prioritariamente le altre zone della cute circostante procedendo poi dalla parte più pulita a quella più sporca	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
493	Come si effettua la tosse efficace per la persona operata?	Porre le mani sul punto di incisione, assumere una posizione leggermente flessa in avanti, inspirare profondamente con la bocca leggermente aperta e dare 3-4 colpi di tosse	Porre le mani sul sito di incisione, assumere la posizione eretta, inspirare profondamente, dare 3-4 colpi di tosse, ed espellere le secrezioni	Nessuna delle altre risposte è corretta	Porre un cuscino sul sito di incisione, assumere la posizione di Fowler, inspirare lentamente, dare 6-8 colpi di tosse, ed espellere le secrezioni	INFERMIERISTICA GENERALE
494	Quale tra le seguenti è una metodica di somministrazione dell'aerosolterapia?	Tutte le altre risposte sono corrette	Spray con distanziatore	Apparecchio pneumatico	Apparecchio ad ultrasuoni	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

495	Un paziente ricoverato nel tuo reparto viene sottoposto a paracentesi, delle seguenti azioni quale è quella corretta?	Misuri e registri il volume e le caratteristiche del liquido raccolto	Posizioni il paziente durante la procedura in Trendelmburg anteriore	Durante la procedura misuri costantemente la temperatura corporea	Tutte le altre risposte sono corrette	INFERMIERISTICA GENERALE
496	Individua l'azione NON corretta nell'esecuzione di un esame urine con strisce reagenti:	Fornire alla persona un contenitore sterile per la raccolta delle urine	Accertare e segnalare le presenza di fattori che possono influenzare il campione	Immergere la striscia reagente nel campione delle urine per il tempo indicato dalle istruzioni	Confrontare i cambiamenti di colore con la tabella colorimetrica presente sul contenitore	INFERMIERISTICA GENERALE
497	Cos'è la scala di Norton:	uno strumento di valutazione utile ad individuare pazienti a rischio di lesione cutanea da pressione	una scala analogico visuale per la autovalutazione del dolore	uno strumento di rilevazione del danno sensoriale	uno strumento di valutazione per individuare il grado di dipendenza del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
498	In caso di vene varicose agli arti inferiori, quale delle seguenti raccomandazioni non è indicata?	Mantenere più a lungo possibile la posizione sdraiata	Evitare di mantenere per lungo tempo la posizione eretta	Usare calze elastiche	Tenere gli arti sollevati	INFERMIERISTICA GENERALE
499	Se un paziente deve subire un intervento chirurgico d'urgenza, quale tra i seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere?	Incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici	Somministrare la pre anestesia	Avvisare i familiari	Posizionare un catetere vescicale	INFERMIERISTICA GENERALE
500	Nell'istillazione di gocce oculari, l'infermiere deve:	Tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore	Tirare delicatamente verso l'alto la palpebra superiore	Chiedere al paziente di guardare verso il pavimento	Appoggiare delicatamente il contagocce alle ciglia	INFERMIERISTICA GENERALE
501	Per pollachiuria si intende:	L'elevata frequenza delle minzioni	La perdita involontaria di urine	L'eccessiva quantità di urina prodotta	La minzione difficoltosa e dolorosa	INFERMIERISTICA GENERALE
502	In caso di pneumotorace, il catetere inserito in cavità pleurica deve:	Essere collegato a valvola ad acqua	Essere collegato a sacchetto sterile a caduta	Restare clampato in prima giornata	Essere lasciato aperto ma sotto medicazione occlusiva	INFERMIERISTICA GENERALE
503	In un paziente con pneumotorace che viene portato in pronto soccorso, l'infermiere deve accertare:	Cianosi, dispnea, possibile spostamento tracheale, tachicardia	Sudorazione, midriasi, bradicardie, ipotensione	tutte le altre risposte sono corrette	Bradipnea, ipotensione	INFERMIERISTICA GENERALE
504	Per accertare una persona che presenta insufficienza cardiaca destra un infermiere deve:	controllare se sono presenti giugulari distese quando il letto è inclinato di 45 gradi	auscultare uno sfregamento pericardico	controllare l'irradiazione della sensazione opprimente sotto lo sterno	auscultare suoni cardiaci S1 e S2 cupi	INFERMIERISTICA GENERALE
505	La scala di EXTON-SMITH si usa per:	valutare il rischio di insorgenza di lesioni da decubito	valutare il rischio di infezione di una ferita chirurgica	valutare lo stato nutrizionale	valutare lo stato mentale	INFERMIERISTICA GENERALE
506	La scala di braden identifica i pazienti a rischio ed ha un valore soglia di:	16	17	23	15	INFERMIERISTICA GENERALE
507	Se un infermiere riporta in cartella infermieristica un valore calcolato con l'utilizzo della scala ASEPSIS, significa che ha effettuato una valutazione:	Sul processo di guarigione di una ferita chirurgica	Sul processo di sterilizzazione	Sul rischio di contrarre infezioni, stimato nella fase precedente l'intervento chirurgico	Sul rischio di contrarre infezioni, rilevato dopo l'intervento chirurgico	INFERMIERISTICA GENERALE
508	Cosa valuta la scala di Maslow?	Le necessità e i bisogni dell'uomo	Lo stato di coscienza	Il rischio infettivo	Il rischio professionale	INFERMIERISTICA GENERALE
509	Quali sono le componenti fondamentali della pratica infermieristica?	Tutte le altre risposte sono corrette	L'olismo, la difesa e il sostegno della persona	L'assistenza e l'educazione dell'utente	La promozione, il mantenimento ed il ripristino della salute	INFERMIERISTICA GENERALE
510	Con il termine anuria si intende la:	mancata produzione di urina	produzione di urina > a 500 ml/24 ore	mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica	produzione di urina < a 500 ml/24 ore	INFERMIERISTICA GENERALE
511	Interrogando una banca dati mediante la striscia di ricerca "emicrania AND cefalea", si ottengono:	Solo gli articoli che contengono entrambi i termini "emicrania" e "cefalea"	Solo gli articoli che contengono "emicrania", "AND" e "cefalea"	Qualsiasi articolo che contenga il termine "emicrania" o in alternativa "cefalea"	Gli articoli dove i termini "emicrania" e "cefalea" sono utilizzati dagli autori come sinonimi	INFERMIERISTICA GENERALE
512	Le infezioni ospedaliere maggiormente riscontrate nei nosocomi italiani secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute sono le:	infezioni del tratto urinario	nessuna delle altre risposte è corretta	infezioni della ferita chirurgica	infezioni delle vie respiratorie	INFERMIERISTICA GENERALE
513	La principale azione della digitale nel trattamento della insufficienza cardiaca è:	l'aumento della forza contrattile del cuore	diminuzione della cronotropia	la riduzione della frequenza cardiaca	il controllo della diuresi	INFERMIERISTICA GENERALE
514	Completare la seguente frase con l'opzione corretta: "Per tachicardia si intende una frequenza _____ battiti al minuto".	superiore a 100	tra 60 e 70	tra 80 e 90	tra 70 e 80	INFERMIERISTICA GENERALE
515	Un ago 22 gauge rispetto a un ago 18 gauge è:	Più piccolo	Delle stesse dimensioni ma con filettatura diversa	Di materiale diverso	Più grande	INFERMIERISTICA GENERALE
516	Le teorie e modelli infermieristici, per quanto diversi tra loro, hanno in comune alcuni concetti fondamentali; quali?	Uomo, ambiente, salute - malattia, assistenza infermieristica	Diagnosi infermieristica, processo di assistenza e piano di assistenza	Raccolta e analisi dei dati, individuazione del problema del paziente, pianificazione dell'assistenza infermieristica, attuazione e valutazione	Bisogno, autonomia e problema	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

517	L'incapacità del paziente di evacuare feci normali, la presenza di liquame fecale, lo stimolo continuo a defecare sono condizioni anomale che fanno ipotizzare la presenza di:	un fecaloma	una fistola anorettale	di una fistola urogenitale	emorroidi del terzo stadio	INFERMIERISTICA GENERALE
518	La disuria è una minzione:	dolorosa	dolorosa ed ematica	che avviene senza stimolo di urinare	frequente, di poche gocce di urina	INFERMIERISTICA GENERALE
519	Nella fase dell'accertamento, l'ispezione è riferita:	Al solo esame visivo	All'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione e alla percussione	All'esame fisico e psichico	All'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione, alla percussione e all'intervista	INFERMIERISTICA GENERALE
520	L'Unita Internazionale è la:	Centesima parte di 1 ml	Centesima parte di 10 ml	Decima parte di 1 ml	Cinquantesima parte di 1 ml	INFERMIERISTICA GENERALE
521	Il parenchima renale è suddiviso in:	corticale e midollare	capsula e surreni	calici e nefroni	nefroni e tubuli	INFERMIERISTICA GENERALE
522	Una ghiandola si definisce endocrina quando:	Il prodotto di secrezione viene riversato direttamente nel sangue	È situata all'interno della cavità addominale	Il prodotto di secrezione viene riversato nel sistema linfatico	È situata nell'apparato digerente	INFERMIERISTICA GENERALE
523	Tra i fattori di rischio cardiovascolare elencati NON viene normalmente incluso:	L'esercizio fisico	Il peso	La familiarità	Il diabete mellito	INFERMIERISTICA GENERALE
524	La professione infermieristica è orientata:	all'uomo nella sua globalità	all'uomo nel suo ambiente	ai bisogni fisici dell'uomo	ai bisogni psicologici dell'uomo	INFERMIERISTICA GENERALE
525	La diaforesi è:	una profusa sudorazione	una sudorazione normale	la stimolazione elettrica di una miocellula	il trattamento preventivo del plasma per la somministrazione umana	INFERMIERISTICA GENERALE
526	L'infusione continua di Dopamina a basse dosi può determinare:	Vasodilatazione nel letto vascolare renale	Vasocostrizione nel letto vascolare mesenterico	Vasocostrizione nel letto vascolare intracerebrale	Moderato aumento della frequenza cardiaca e della forza contrattile del cuore	INFERMIERISTICA GENERALE
527	Per assorbimento di un farmaco si intende il passaggio di un farmaco:	dal punto di somministrazione al circolo ematico sistemico	dal sistema arterioso a sistema venoso	nessuna delle altre risposte è corretta	dallo stomaco all'intestino	INFERMIERISTICA GENERALE
528	L'ipoglosso è un nervo:	motorio	misto	sensitivo	sensoriale	INFERMIERISTICA GENERALE
529	L'organo del Corti si trova:	Nell'orecchio	Nell'occhio	Nel fegato	Nel pancreas	INFERMIERISTICA GENERALE
530	Tra quelle elencate, indicare quale non è una raccomandazione di buona pratica per la corretta gestione del drenaggio chirurgico:	sono tutte raccomandazioni di buona pratica assistenziale	controllare periodicamente la posizione delle varie clamp e valvole	in presenza di cambiamento qualitativo del drenato rispetto agli standard per tipologia d'intervento informare il chirurgo che valuterà la manovra più opportuna da effettuarsi	mantenere il circuito chiuso (asettico) per tutto il periodo di permanenza del dispositivo	INFERMIERISTICA GENERALE
531	Nelle emorragie dovute a rottura delle varici esofagee è utile:	introdurre una sonda di Sengstaken - Blakemore	usare anticoagulanti	introdurre una sonda di Dormia	procedere con una fundo-plicatio secondo Nissen	INFERMIERISTICA GENERALE
532	Il polso paradossale è caratteristico di:	tamponamento cardiaco	pneumotorace	stenosi mitralica post reumatica	stenosi valvolare aortica	INFERMIERISTICA GENERALE
533	Esaminando la capacità di un paziente nello svolgere correttamente e autonomamente le IADL all'interno di una valutazione multidimensionale, quale delle seguenti attività NON dovrà essere analizzata:	usare i servizi igienici in modo appropriato	usare mezzi di trasporto	utilizzare il telefono	fare acquisti	INFERMIERISTICA GENERALE
534	Quali sono i cateteri vescicali temporanei:	Nelaton, Tieneman, Mercier	Nessuna delle altre risposte è corretta	Levin, Einhors, Faucher	Foley, Pezzer, Couvelier	INFERMIERISTICA GENERALE
535	La Protamina solfato è usato come antidoto:	Dell'eparina	Dei benzodiazepinici	Dei farmaci stupefacenti oppioidi	Dei farmaci non steroidei	INFERMIERISTICA GENERALE
536	La tolleranza farmacologica è:	la necessità di aumentare progressivamente le dosi per ottenere lo stesso effetto che all'inizio del trattamento si osserva con dosi minori di farmaco	la necessità di diminuire progressivamente le dosi per avere effetti minori	la possibilità di non dovere diminuire le dosi per ottenere un determinato effetto	la necessità di mantenere le stesse dosi per avere sempre lo stesso effetto	INFERMIERISTICA GENERALE
537	Il monossido di carbonio è letale perché:	compete con O2 nel legame con Hb	inibisce la citocromo ossidasi	modifica la struttura della Hb	produce metaemoglobina	INFERMIERISTICA GENERALE
538	Il tempo impiegato dall'operatore sanitario per comunicare con la persona assistita:	È tempo di cura	È tempo da impiegare a discrezione dell'operatore	È tempo sprecato	È tempo deciso dalla persona assistita	INFERMIERISTICA GENERALE
539	Quale opzione di risposta riporta la definizione di emottisi?	L'emottisi è emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie	L'emottisi è emissione di sangue con le feci	L'emottisi è emissione di sangue dall'apparato urinario	L'emottisi è emissione di sangue proveniente dalle vie digestive	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

540	Con il termine disfagia si intende:	difficoltà alla deglutizione	assunzione di quantità abnormi di cibo	l'avversione ai cibi	senso di fame insaziabile	INFERMIERISTICA GENERALE
541	La diarrea ad acqua di riso è un segno tipico:	Del colera	Della shigellosi	Della colite pseudomembranosa	Del tifo	INFERMIERISTICA GENERALE
542	L'istamina è immagazzinata nei granuli di:	Mastociti	Fibroblasti	Linfociti	Macrofagi	INFERMIERISTICA GENERALE
543	L'omeostasi è il mantenimento:	Dell'equilibrio biologico dell'organismo	Del circolo capillare	Della posizione corporea	Della stazione eretta	INFERMIERISTICA GENERALE
544	P.D.C.A. è l'acronimo che indica:	il ciclo di Deming	la pianificazione assistenziale	il ciclo formativo	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
545	Nella gradazione dei tumori il grado IV definisce i tumori costituiti da cellule:	Indifferenziate	Con differenziazione di medio grado	Il cui grado di differenziazione non è definibile	Molto differenziate	INFERMIERISTICA GENERALE
546	L'aumento della frequenza respiratoria si definisce come:	tachipnea	dispnea	iperpnea	polipnea	INFERMIERISTICA GENERALE
547	L'entità di un'emorragia digestiva si valuta mediante la diminuzione del valore ematico di:	Emoglobina	Ematocrito	Emazie	Piastrine	INFERMIERISTICA GENERALE
548	I seguenti sono tutti segni e sintomi dell'infezione di una ferita chirurgica, eccetto:	cute circostante la ferita fredda e pallida	secrezioni aumentate e purulente	aumento della tumefazione in sede di ferita	eventuale presenza di febbre	INFERMIERISTICA GENERALE
549	Il concetto di ambiente secondo il modello concettuale di F. Nightingale è:	inteso in senso globale	essenzialmente fisico	legato al ruolo dell'infermiere	essenzialmente psicosociale	INFERMIERISTICA GENERALE
550	Con il termine "spazio morto" si fa riferimento a:	Zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi	Zone cicatriziali dalla sensibilità limitata	Zone muscolari non attraversate da fasci nervosi	Parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti	INFERMIERISTICA GENERALE
551	Il più comune effetto di una dose tossica di paracetamolo è:	la necrosi epatocellulare	il sanguinamento gastrointestinale	l'agranulocitosi	l'iperpiressia	INFERMIERISTICA GENERALE
552	La sieroprofilassi:	Conferisce una immunità immediata ma temporanea	Conferisce una immunità naturale e attiva	Attiva una risposta immunitaria duratura nel tempo	In Italia è obbligatoria per patologie come il tetano	INFERMIERISTICA GENERALE
553	La parte del cuore che riceve il sangue dalla periferia è:	l'atrio destro	il ventricolo sinistro	l'atrio sinistro	il ventricolo destro	INFERMIERISTICA GENERALE
554	Quale tra questi ormoni è deputato al controllo dei meccanismi immunitari?	Timosina	Aldosterone	Glucagone	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
555	La chiusura di una ferita utilizzando mezzi di sutura è definita:	chiusura per prima intenzione	chiusura per granulazione	chiusura per emostasi	chiusura per seconda intenzione	INFERMIERISTICA GENERALE
556	Dove è tipicamente localizzato in sede, il dolore anginoso:	retrosterale	mesogastrico	emitorace destro	fosse iliaca sinistra	INFERMIERISTICA GENERALE
557	Il termine "anosmia" definisce:	Una riduzione o perdita dell'olfatto	Un'alterazione dell'osmolarità del sangue	Una riduzione o perdita del gusto	Una perdita temporanea del visus	INFERMIERISTICA GENERALE
558	Il modello concettuale delle attività di vita è stato elaborato da:	N.Roper	D. Orem	V. Henderson	F. Nightingale	INFERMIERISTICA GENERALE
559	La febbre remittente è un tipo di febbre in cui:	la temperatura subisce variazioni superiori o inferiori a 1°C senza però raggiungere la defervescenza	si alternano giorni di apiressia a giorni di febbre	la temperatura iniziale tende ad alzarsi al mattino fino al picco massimo nelle ore pomeridiane, per poi scendere e normalizzarsi nelle ore serali, fino al mattino seguente, quando comincerà ad alzarsi di nuovo	la temperatura si mantiene elevata con oscillazioni inferiori a 1°C	INFERMIERISTICA GENERALE
560	Gli indicatori della scala di Braden sono:	percezione sensoriale, umidità, attività motoria, nutrizione, frizione e scivolamento	secchezza cutanea, percezione sensoriale, stato funzionale, nutrizione, frizione e scivolamento	umidità, autonomia, nutrizione, stato funzionale, frizione e scivolamento	incontinenza, secchezza cutanea, umidità cutanea, frizione e scivolamento	INFERMIERISTICA GENERALE
561	Il valore di "cut off" in una scala di valutazione dell'assistenza è detto anche:	valore soglia	valore liminale	valore di specificità	valore massimale	INFERMIERISTICA GENERALE
562	L'effetto dromotropo negativo di un farmaco è la capacità di:	Ridurre la velocità di conduzione dei nodi senoatriale e atrioventricolare	Diminuire la frequenza cardiaca	Aumentare la forza contrattile del cuore	Aumentare la frequenza cardiaca	INFERMIERISTICA GENERALE
563	Quale tra le seguenti è la definizione corretta di bronchiectasie?	Dilatazioni abnormi ed irreversibili di un tratto dell'albero bronchiale	Dilatazioni reversibili di un tratto dell'albero bronchiale	Restringimenti irreversibili del lume dei bronchi	Di infezioni croniche o ricorrenti dell'apparato respiratorio	INFERMIERISTICA GENERALE
564	Gli scambi respiratori avvengono:	negli alveoli	nei bronchioli respiratori	nei bronchi	nella trachea	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

565	Lo sfintere pilorico è un anello muscolare che separa:	lo stomaco dall' intestino tenue	l'intestino tenue dal crasso	lo stomaco dall' intestino crasso	l'esofago dallo stomaco	INFERMIERISTICA GENERALE
566	I pazienti affetti da patologia cronica necessitano di:	informazioni, follow up regolari, sostegno non solo a livello personale ma anche dei caregiver	prestazioni specialistiche monoprofessionali	gestire solo le riacutizzazioni della patologia cronica	assistenza occasionale	INFERMIERISTICA GENERALE
567	In una persona disfagica, durante il pasto, è indicato controllare la comparsa di:	tosse	tachicardia	voce gorgogliante	pallore	INFERMIERISTICA GENERALE
568	E'/sono la causa più frequente di emorragia gastro-intestinale:	L'ulcera duodenale	La gastrite erosiva	Le varici esofagee	La gastrite atrofica	INFERMIERISTICA GENERALE
569	Le dimensioni del bracciale dello sfigmomanometro devono essere commisurate:	Alla costituzione fisica del paziente	Alla statura del paziente	Al sesso del paziente	Alla costituzione fisica del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
570	La scala di valutazione dell'indice di Brass è utilizzata per:	valutare l'indice di rischio di dimissione difficile	valutare la autonomia dello stato funzionale	tutte le altre risposte sono corrette	valutare il rischio di lesioni da pressione	INFERMIERISTICA GENERALE
571	Il ferro per via orale va assunto:	A stomaco pieno	Con molta acqua	Secondo le preferenze del paziente	Lontano dai pasti	INFERMIERISTICA GENERALE
572	L 'aorta nasce:	dal ventricolo sinistro del cuore	dall'atrio sinistro del cuore	dal tronco dell'arteria polmonare	dal ventricolo destro del cuore	INFERMIERISTICA GENERALE
573	Le valvole a nido di rondine si trovano:	nelle vene	nell'aorta ascendente	tra atri e ventricoli	nelle arterie degli arti inferiori	INFERMIERISTICA GENERALE
574	In un test di screening la specificità è del 95%. La percentuale di falsi positivi che esso potrà mostrare:	Sarà del 5%	Dipenderà dall'accuratezza dell'esecuzione	Sarà del 95%	Sarà variabile in relazione alla patologia	INFERMIERISTICA GENERALE
575	L'aumento considerevole del marcatore CEA può essere indice della presenza di neoplasia:	Tutte le altre risposte sono corrette	All'intestino	Al polmone	Alla mammella	INFERMIERISTICA GENERALE
576	Il massaggio cardiaco esterno va continuato finché vi è:	ricomparsa del polso carotideo	ricomparsa del ritmo stabilmente sinusale	ricomparsa del respiro spontaneo	esecuzione della defibrillazione	INFERMIERISTICA GENERALE
577	Costituisce un rischio specifico da considerare in caso di fibrillazione atriale, anche se sottoposta a cardioversione.	Si tratta della tromboembolia arteriosa	Si tratta dell'ustione da scarica elettrica	Si tratta dell'arresto cardiaco improvviso	Si tratta dell'extrasistolia notturna	INFERMIERISTICA GENERALE
578	La peristalsi non è presente:	nella vena cava	nello stomaco	nell'esofago	nelle tube uterine	INFERMIERISTICA GENERALE
579	In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza, è indicato scegliere cateteri:	Vescicali in silicone o in siliconato in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi	Vescicali a tre vie per eseguire lavaggi vescicali in casi di infezioni	Vescicali a tre vie per eseguire esami uro dinamici e colturali in sicurezza	Vescicali in lattice in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi	INFERMIERISTICA GENERALE
580	Secondo la classificazione EPUAP/NPUAP in una lesione da decubito al 3° stadio si assiste a degenerazione e necrosi del tessuto:	Cutaneo e sottocutaneo fino alla fascia muscolare	Del tessuto cutaneo	Del tessuto cutaneo, sottocutaneo e di tutta la fascia muscolare	Muscolare e osseo	INFERMIERISTICA GENERALE
581	Il Barthel Index valuta:	Attività di vita quotidiana	Disturbi comportamentali	Stato cognitivo	Rischio di cadute	INFERMIERISTICA GENERALE
582	La scala di Braden per valutare il rischio di lesione da pressione, prende in considerazione:	Il grado di esposizione della pelle all'umidità	La presenza di disturbi psichiatrici maggiori	L'idratazione	Le abitudini urinarie	INFERMIERISTICA GENERALE
583	Quale tra queste scale di valutazione del dolore può essere utilizzata per la valutazione del dolore in un bambino di 6 anni?	Face pain scale	Scala analogico visiva	Verbal rating scale	Numeric rating scale	INFERMIERISTICA GENERALE
584	Il valore di Body Max Index pari a 28, corrisponde a:	sovrappeso	obeso	sottopeso	normopeso	INFERMIERISTICA GENERALE
585	Nella posizione di Sims la persona è posta sul fianco:	sinistro semiprona	destro prona	destro semiprona	sinistro prona	INFERMIERISTICA GENERALE
586	Il sollevatore è uno strumento:	meccanico che permette il sollevamento del paziente compromesso dal punto di vista motorio	meccanico che permette la rotazione del paziente dal letto alla sedia a rotelle	che facilita la rotazione del paziente che è in grado di stare in piedi ma ha difficoltà a fare piccoli passi	meccanico che permette all'infermiere di eseguire una manovra di spostamento del paziente in breve tempo	INFERMIERISTICA GENERALE
587	Nel respiro di Cheyne-Stokes:	la frequenza e la profondità respiratoria aumentano gradualmente al di sopra della norma, per poi decrescere fino ad arrivare ad una breve apnea	la frequenza e la profondità respiratoria risultano costantemente aumentati al di sopra della norma	gli atti respiratori sono poco profondi e vengono intervallati da periodi di apnea	la frequenza respiratoria è regolare per profondità ma ridotta per numero di atti al minuto	INFERMIERISTICA GENERALE
588	Se un paziente è sonnolento ma risvegliabile ed ha una reazione ritardata agli stimoli, si dice che è:	soporoso	comatoso	vigile	stuporoso	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

589	Per quale tipologia di pazienti è frequentemente utilizzata la rilevazione della temperatura corporea per via rettale?	Bambino	Anziano	Soggetto in coma	Non esistono controindicazioni a questo tipo di rilevazione	INFERMIERISTICA GENERALE
590	Se si chiede ad un paziente "Chi è l'attuale Presidente della Repubblica", quale tipo di accertamento si sta attuando?	Stato mentale	Dati culturali	Dati sensoriali	Dati generali	INFERMIERISTICA GENERALE
591	In caso di ematochezia occorre valutare le caratteristiche organolettiche di:	feci	espettorato	vomito	urina	INFERMIERISTICA GENERALE
592	Per quale motivo l'infermiere incoraggia il paziente a riferire la comparsa e la frequenza del vomito?	Per evitare complicanze quali disidratazione e squilibri elettrolitici	Per evitare faringiti	Per evitare congiuntiviti	Per evitare il rischio di caduta e di lesione	INFERMIERISTICA GENERALE
593	In caso di diaforesi eccessiva l'intervento PRIMARIO tra quelli elencati è:	aumentare l'introito di liquidi	effettuare l'igiene	diminuire l'introduzione di cibi ricchi di fibre	indossare indumenti di cotone	INFERMIERISTICA GENERALE
594	Qualora la tosse si accompagni ad espettorato è importante registrare la:	quantità e i cambiamenti delle caratteristiche delle secrezioni	comparsa di rossore al viso e alle estremità degli arti	presenza di incontinenza durante i colpi di tosse	difficoltà di assumere liquidi durante le ore notturne	INFERMIERISTICA GENERALE
595	Nel posizionamento del condom urinario l'infermiere deve avere l'accuratezza di:	posizionare senza stringere eccessivamente la fascetta adesiva	stringere la fascetta adesiva per evitare la perdita di urina	utilizzare il dispositivo esclusivamente per le persone con infezioni del tratto urinario	applicare il dispositivo esclusivamente in lattice	INFERMIERISTICA GENERALE
596	Indicare con chi si effettua la scelta dei pannoloni adatti per il tipo di incontinenza della persona assistita:	Con la persona stessa, cercando di ridurre l'impatto dell'incontinenza sulla qualità di vita	Con il medico curante responsabile della prescrizione	Con l'OSS per ridurre la quantità dei presidi utilizzabili	Con il familiare cercando la collaborazione del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
597	Durante l'esecuzione del prelievo venoso la pressione esercitata dal laccio emostatico deve essere:	moderata, pari o poco superiore a quella diastolica del paziente	moderata, pari o poco inferiore a quella sistolica del paziente	tale da non causare dolore eccessivo al paziente, superiore alla pressione sistolica	tale da non provocare fastidio eccessivo al paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
598	Dovete eseguire un prelievo capillare per la determinazione della glicemia su sangue capillare, prima di pungere il polpastrello eseguite un lavaggio delle mani con:	acqua e sapone detergente e indossate i guanti puliti	soluzione idroalcolica e non indossate i guanti	soluzione alcolica e indossate i guanti sterili	acqua e sapone antisettico e indossate i guanti	INFERMIERISTICA GENERALE
599	L'isolamento protettivo consiste nella separazione da altri assistiti del paziente:	con neutropenia severa	per il periodo di contagiosità della malattia	per malattie infettive respiratorie	con modalità di isolamento a coorte	INFERMIERISTICA GENERALE
600	La modalità più efficace per interrompere la catena dell'infezione è:	il lavaggio delle mani	l'utilizzo dei guanti	l'uso di dispositivi di protezione individuale	l'uso dei disinfettanti	INFERMIERISTICA GENERALE
601	La flora batterica transitoria di solito:	è associata con le infezioni correlate alla pratica assistenziale	è associata ad infezioni delle vie urinarie e dell'apparato respiratorio	non è associata ad infezioni ma ha una funzione di antagonismo microbico	non è associata ad infezione ma sono i batteri acquisiti dall'operatore durante le manovre assistenziali	INFERMIERISTICA GENERALE
602	Durante la misurazione della pressione arteriosa, per quale motivo devo sorreggere il braccio del paziente?	Per inibire la contrazione isometrica muscolare	Per favorire la gittata cardiaca ed il volume di eiezione in aorta	Per migliorare il ritorno venoso al cuore	Per aumentare il comfort del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
603	Durante lo svuotamento del pappagallo del Sig L.S. l'infermiere osserva una variazione del colore delle urine. Tra i seguenti qual è il primo intervento che attua?	Effettua esame delle urine con striscia reagente	Applica un condom	Rileva la saturazione di ossigeno	Posiziona la traversa salvaletto	INFERMIERISTICA GENERALE
604	In caso di dolore, si possono riscontrare segni di aumento della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, dilatazione delle pupille e diaforesi. Questo accade se si tratta di dolore:	acuto	che perdura da diversi giorni	cronico	trattato farmacologicamente	INFERMIERISTICA GENERALE
605	L'accertamento della signora Laura riporta frequente diuresi e incontinenza quando tossisce. Come indichereste questa condizione?	Incontinenza urinaria da stress	Incontinenza urinaria funzionale	Incontinenza urinaria da urgenza	Incontinenza urinaria riflessa	INFERMIERISTICA GENERALE
606	La scala di Conley è uno strumento utilizzato per valutare il rischio di caduta del paziente (età >= 65 anni), pertanto è una scala che:	aiuta a scegliere gli interventi preventivi	deve essere compilata dall'operatore socio-sanitario	consiglia gli interventi curativi	consiglia l'approccio diagnostico terapeutico al medico	INFERMIERISTICA GENERALE
607	Il signor G. di 70 anni è ricoverato in oncologia, è vigile, orientato e autosufficiente nelle attività di vita quotidiana. Presenta un problema di nutrizione inferiore al fabbisogno. Cosa consigliereste al signor G?	Consumare pasti piccoli e frequenti	Utilizzare spezie per migliorare il gusto e l'aroma dei cibi	Favorire l'assunzione di pasti caldi ad alto contenuto calorico	Effettuare spuntini con cracker negli intervalli tra un pasto e l'altro	INFERMIERISTICA GENERALE
608	Con il termine fecaloma si intendono feci:	dure, stipate nel retto che non si riescono a espellere	dure, stipate nel retto che vengono espulse con difficoltà	caprine che vengono espulse a seguito di somministrazione di un lassativo	di consistenza dura con presenza di strie di sangue	INFERMIERISTICA GENERALE
609	Per raccogliere un campione di urina sterile nell'adulto è bene consigliare di:	eseguire l'igiene intima prima del prelievo e raccogliere l'urina del mitto intermedio	eseguire l'igiene intima dopo ogni minzione e prelevare un campione dal contenitore di raccolta	mescolare le urine nel contenitore delle urine delle 24 ore e prelevare un campione successivamente	urinare nella padella e prelevare un campione in una provetta sterile	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

610	Il signor G., presenta due apparecchi gessati a entrambi gli arti superiori. Dovete procedere con la rilevazione della frequenza cardiaca, quali sedi indagate:	Poplitea	Ulnare	Carotidea	Femorale	INFERMIERISTICA GENERALE
611	La signora G., portatrice di catetere vescicale, vi chiama per comunicarvi che sente la necessità di urinare. Come procedete?	Controllate la presenza di globo vescicale	Controllate la diuresi delle ultime 24 ore	Controllate che ci sia presenza di urine nella sacca di raccolta	La rassicurate che avendo il catetere vescicale ciò non è possibile, è solo una sensazione	INFERMIERISTICA GENERALE
612	Una lesione da pressione classificata al secondo stadio (NPUAP) è caratterizzata da:	parziale perdita di spessore cutaneo	perdita completa dello strato cutaneo	eritema persistente non sbiancabile	perdita piena di spessore tissutale	INFERMIERISTICA GENERALE
613	State assistendo il signor R. che è stato sottoposto a intervento chirurgico per la sintesi di frattura del femore conseguente a caduta accidentale. Dovendo eseguire la medicazione della ferita chirurgica con tecnica asettica per la detersione del sito utilizzate:	soluzione fisiologica	soluzione antisettica a base di iodio	soluzione a base di clorexidina	soluzione fisiologica e acqua ossigenata	INFERMIERISTICA GENERALE
614	Stai effettuando l'igiene intima-perineale a letto al signor G. Al termine dell'operazione ti assicuri che il prepuzio sia correttamente posizionato sul glande perché non vuoi causare:	edema del glande	imbarazzo della persona	difficoltà nella minzione	orchite	INFERMIERISTICA GENERALE
615	Nella valutazione del dolore la scala VAS è rappresentata da una retta con:	due estremità che corrispondono a "nessun dolore" e "massimo dolore possibile"	aree di diverso colore, dove l'intensità del colore corrisponde all'intensità del dolore	una serie di numeri progressivi, da 1 a 10, dove 1 corrisponde a nessun dolore e 10 al massimo dolore	la presenza di aggettivi che quantificano il dolore da "nessuno" a "molto forte"	INFERMIERISTICA GENERALE
616	Dovete eseguire un prelievo venoso alla signora Francesca, la quale presenta linfostasi al braccio destro. Francesca è mancina. Quale sede scegliereste per effettuare il prelievo?	Il braccio sinistro	Il braccio destro senza l'utilizzo del laccio emostatico	La mano destra senza l'utilizzo del laccio emostatico	Optate per un prelievo capillare	INFERMIERISTICA GENERALE
617	La scala di Norton prende in considerazione i fattori di seguito elencati:	Mobilità, deambulazione, incontinenza, livello di autonomia nelle ADL, condizioni mentali	Incontinenza, condizioni psichiche, mobilità, allettamento, integrità cutanea	Condizioni mentali, condizioni fisiche, incontinenza, alimentazione, mobilità	Incontinenza, mobilità, condizioni mentali, allettamento, nutrizione	INFERMIERISTICA GENERALE
618	Le normali sedi di rilevazione della frequenza cardiaca di un adulto sono:	Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale, Ulnare, Femorale, Tibiale posteriore, Dorsale del piede	Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale. Femorale, posteriore del piede	Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale, Ulnare, Femorale, posteriore del piede	Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale, Femorale	INFERMIERISTICA GENERALE
619	Per disfagia esofagea si intende:	rallentamento del passaggio del cibo dall'esofago allo stomaco	difficoltà ad iniziare la deglutizione	incapacità di trasferire il cibo dalla cavità orale all'esofago	difficoltà nella digestione e reflusso esofageo	INFERMIERISTICA GENERALE
620	Con il termine "melena" si intende l'emissione dal retto di feci:	Nere, aspetto piceo e maleodoranti	Chiare e maleodoranti	Con striature di sangue rosso vivo	Con intenso sangue rosso vivo	INFERMIERISTICA GENERALE
621	Le principali complicanze che possono verificarsi durante la nutrizione entrale con sondino naso gastrico sono:	Vomito, diarrea, stipsi e reflusso gastro-esofageo	Vomito, malnutrizione glucidico calorica, diarrea e cacchessia	Stipsi, ileo paralitico, malnutrizione proteica calorica e vomito	Diarrea, malnutrizione proteica calorica, stipsi e disfagia	INFERMIERISTICA GENERALE
622	Nell'accertamento infermieristico del dolore, l'infermiere può utilizzare le seguenti scale:	VAS, VNS, CHEOPS	GCS, GPCS, AIS	TINETTI, BRASS, BRISTOL	BARTHEL, GOS, KATS	INFERMIERISTICA GENERALE
623	La Glasgow Coma Scale (GCS) è una scala basata su tre parametri:	Apertura degli occhi, risposta verbale, risposta motoria	Apertura della bocca, risposta motoria, risposta palpebrale	Apertura degli occhi, risposta motoria, risposta non verbale	Apertura degli occhi, risposta verbale, risposta corneale	INFERMIERISTICA GENERALE
624	Nell'assistenza al pasto del Sig. Aldo, affetto da disfagia, quale comportamento messo in atto dall'Infermiere NON è da ritenersi corretto?	Conversare con l'assistito e cercare di distrarlo	Incoraggiare i colpi di tosse e la deglutizione della saliva dopo la tosse	Introdurre una quantità di cibo equivalente a un cucchiaino da caffè per volta	Ispezionare il cavo orale regolarmente e se si rileva la presenza di residui alimentari rimuoverli	INFERMIERISTICA GENERALE
625	I farmaci stupefacenti in reparto devono essere conservati:	In una cassetta con serratura, in armadi chiusi a chiave	Nell'armadio dei farmaci	Nello studio della caposala	Nello studio medico, in un armadio con etichetta identificativa	INFERMIERISTICA GENERALE
626	Nell'assistere una persona cui si somministra l'alimentazione tramite PEG, per prevenire la complicanza "aspirazione", l'infermiere misura il ristagno gastrico:	Prima dell'inizio dell'alimentazione, posizionando la persona a 30 - 45 GRADI	Prima dell'inizio dell'alimentazione, posizionando la persona in decubito prono	Al termine dell'alimentazione, posizionando la persona supina	Durante l'alimentazione, posizionando la persona supina ogni 20 minuti	INFERMIERISTICA GENERALE
627	Nella diarrea severa la dieta deve essere:	Povera di scorie, di cibi grassi e derivati del latte e di bevande nervine	Ipoproteica, ricca di fibre e derivati del latte, ma priva di grassi	Iposodica e ricca di frutta acida e astringente (ad es. succo di limone)	Povera di sodio e magnesio, ricca di legumi	INFERMIERISTICA GENERALE
628	Nella fase preoperatoria, l'infermiere deve accertarsi, prima della somministrazione di premedicazioni psicoattive, che il modulo di consenso sia firmato. In quali delle circostanze indicate, il consenso informato è necessario?	Tutte le altre risposte sono corrette	Procedure invasive, come un'incisione chirurgica, una biopsia o una paracentesi	Procedure non chirurgiche, come un'arteriografia, che determini un rischio medio per la persona	Procedure che utilizzano radiazioni	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

629	Quali consigli si forniscono al paziente portatore di fistola artero/venosa per dialisi, al fine di promuoverne il corretto funzionamento?	Sul braccio in cui è stata confezionata la fistola, non si misura la Pressione Arteriosa e non si applicano lacci emostatici	L'accesso può essere utilizzato routinariamente per i prelievi ematici (venosi e arteriosi) e per la rilevazione della pressione arteriosa	Il braccio su cui è allestita la fistola è fasciato stretto per proteggerlo da urti e tagli e può essere utilizzato routinariamente per i prelievi arteriosi	La fistola non richiede particolare protezione. Si può consigliare al paziente di eseguire bagni molto caldi per vasodilatare la fistola	INFERMIERISTICA GENERALE
630	Secondo le "raccomandazioni del ministero della salute per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO", di chi deve essere la firma per le prove crociate?	Di chi effettua il prelievo	Del medico richiedente	Del Coordinatore Infermieristico dipartimentale	Del direttore responsabile del servizio	INFERMIERISTICA GENERALE
631	Nell'assistere la persona con scompenso cardiaco, nel piano educativo alla dimissione, rispetto alla terapia farmacologica, l'infermiere tratterà i seguenti argomenti:	Gli effetti dei farmaci, la dose e l'orario di somministrazione, l'autogestione, i segni di tossicità, gli effetti collaterali e avversi, cosa fare in caso si dimentichi l'assunzione del farmaco	Come assumere tutti farmaci prescritti in una sola somministrazione giornaliera, l'autogestione della malattia	Come modificare il dosaggio dei farmaci cardioattivi secondo le proprie percezioni	Gli effetti collaterali dei farmaci autosomministrati per via endovenosa, l'autogestione della malattia	INFERMIERISTICA GENERALE
632	Per valutare il rischio di cadute di un paziente, l'infermiere utilizza la scala:	Tinetti	Indice di Barthel	Measure FIM	CIRS	INFERMIERISTICA GENERALE
633	La sostituzione delle linee infusionali (deflussori e raccordi) su Catetere Venoso Periferico e su Catetere Venoso Centrale deve essere effettuata:	ogni 96 ore in caso di infusioni continue non contenenti lipidi, sangue o derivati	ogni 6 ore in caso di infusioni continue contenenti lipidi	a discrezione dell'infermiere che si sta occupando della gestione del catetere vascolare dopo aver sentito il parere medico	ogni ora in caso di infusione di sangue ed emoderivati	INFERMIERISTICA GENERALE
634	Le principali complicanze che possono verificarsi durante la nutrizione enterale con sondino naso gastrico sono:	Vomito, diarrea, stipsi, nausea, aspirazione	Vomito, cachessia, reflusso gastro-esofageo	Vomito, diarrea, ileo paralitico, malnutrizione glucidico calorica	Vomito, diarrea, stipsi, malnutrizione proteica calorica	INFERMIERISTICA GENERALE
635	Le complicanze immediate dell'aspirazione delle secrezioni naso-oro tracheali sono:	Ipossiemia, ipotensione, aritmie	Polmonite, bradicardia, ipotensione	Atelettasia, ipertensione, dolore precordiale	Tracheite, ipertensione, costipazione	INFERMIERISTICA GENERALE
636	Nell'assistenza ad una persona sottoposta a rachicentesi occorre:	consigliare l'assunzione di liquidi per ridurre il rischio di emicrania post-procedurale	consigliare rapidamente la ripresa dell'alimentazione	consigliare di rimanere a letto almeno per 48 ore	consigliare di non assumere liquidi per ridurre il rischio di tenesmo post-procedurale	INFERMIERISTICA GENERALE
637	Quali sono gli interventi che il paziente con Insufficienza Renale Cronica dovrebbe eseguire al fine di evitare il sovraccarico di liquidi?	Controlli giornalieri del peso, della Pressione Arteriosa (PA), del turgore delle giugulari, restrizione idrica, igiene del cavo orale	Controlli giornaliero del peso, della Pressione venosa., della circonferenza addominale	Controlli settimanali del peso, dell'alvo e della circonferenza addominale	Controlli giornalieri del peso, della P.A., del turgore delle giugulari, iperidratazione, igiene del cavo orale	INFERMIERISTICA GENERALE
638	La maschera facciale per la somministrazione di ossigeno è controindicata:	nelle persone con grave distress respiratorio e con ritenzione di anidride carbonica	per concentrazioni di ossigeno dal 35% al 45%	nell'ossigeno terapia a breve termine	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
639	Prima di eseguire un prelievo ematico dal catetere venoso centrale, l'infermiere deve eseguire:	Lavaggio antisettico delle mani in qualsiasi caso	Lavaggio sociale delle mani se Catetere Venoso Centrale tunnellizzato	Frizione delle mani con base alcolica se il paziente è a domicilio	Lavaggio chirurgico delle mani se il paziente è in aplasia midollare	INFERMIERISTICA GENERALE
640	Per poter valutare se la persona, in prima giornata postoperatoria, può essere mobilizzata precocemente occorre considerare:	il tipo di intervento, le condizioni dell'assistito, il tipo di anestesia	solo la presenza di drenaggi e di terapia antalgica	le preferenze dell'assistito, il colore dei liquidi raccolti nei drenaggi	le condizioni della ferita, la volontà del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
641	Qualora fosse necessario posizionare il SNG (sondino naso-gastrico) e/o il CV (catetere vescicale) per la durata dell'intervento, si procede alla loro applicazione:	in seguito alla somministrazione dell'anestesia	all'inizio del ricovero	dipende dalla tecnica chirurgica utilizzata durante l'intervento e dalla disponibilità di personale in reparto o in sala operatoria	prima della somministrazione dell'anestesia per ottenere il coinvolgimento della persona assistita	INFERMIERISTICA GENERALE
642	Per consentire l'identificazione precoce di una reazione trasfusionale:	la trasfusione deve iniziare lentamente (circa 2 ml/min) e il paziente deve essere controllato attentamente i primi 15 min	occorre regolare la velocità d'infusione e monitorare la comparsa di effetti collaterali dopo 60 min	la trasfusione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile (circa 20 min)	la trasfusione deve iniziare ad una velocità di circa 30 ml/min e il paziente deve essere controllato attentamente i primi 15 min	INFERMIERISTICA GENERALE
643	E' necessario valutare il deficit cognitivo del signor Antonio. Lo strumento che può essere utilizzato è:	MMSE	NIHSS	CPSS	MNA	INFERMIERISTICA GENERALE
644	Nel paziente portatore di ileostomia, l'emissione di feci molto liquide può portare alla formazione di calcoli urinari, disidratazione e deficit di elettroliti. Quali segni e sintomi si potrebbero riscontrare in questo caso?	Dolore intenso all'addome inferiore, ematuria, tachicardia, cute secca	Dolore intenso all'addome superiore, pollachiuria, tachicardia, cute secca, ritenzione urinaria	Dolore diffuso all'addome, cute sudata, poliuria, vertigini	Sudorazione profusa, bradicardia, confusione mentale	INFERMIERISTICA GENERALE
645	A una persona anziana in trattamento con farmaci diuretici e senza restrizioni dietetiche, sono consigliabili alimenti:	Ricchi di potassio	Poveri di potassio	Poveri di carboidrati	Poveri di proteine	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

646	Quali tra quelli segnalati, sono segni e sintomi di tamponamento cardiaco che l'infermiere deve saper riconoscere?	Aumento PVC, distensione vene giugulari, caduta PA, tachipnea e polso paradosso, oliguria	Diminuzione PVC, aumento PA, tachipnea, tachicardia, diaforesi, oliguria	Tosse, aumento PA, bradipnea e polso paradosso, poliuria	Diminuzione della pressione venosa centrale (PVC), caduta della pressione arteriosa (PA), bradipnea, diaforesi e polso paradosso, anuria	INFERMIERISTICA GENERALE
647	Durante il trattamento radioterapico quali sono i disturbi che insorgono generalmente nei pazienti indipendentemente dal distretto trattato?	Affaticamento e perdita dell'appetito	Nausea e vomito biliare	Mucositi	Disgeusia	INFERMIERISTICA GENERALE
648	Nell'aspirazione delle secrezioni naso-oro tracheale la pre-ossigenazione va effettuata:	Nei pazienti con documentata desaturazione	Nei pazienti in cui lo stimolo del respiro dipende all'ipossia (BPCO)	Nei pazienti che assumono broncodilatatori e cardiocinetici	Sempre	INFERMIERISTICA GENERALE
649	In una persona sottoposta a domicilio ad ossigeno terapia a lungo termine, quali interventi infermieristici specifici occorre pianificare?	Educare la persona alla cura dell'igiene orale e ad un adeguato apporto di acqua	Educare la persona alla cura dell'igiene personale e ad un adeguato apporto di vitamine	Educare la persona ad assumere molto sale alimentare per evitare la disidratazione	Educare la persona a sostituire i presidi almeno due volte al giorno	INFERMIERISTICA GENERALE
650	Un paziente con un'emorragia postoperatoria in atto manifesta dei segni e dei sintomi di ipovolemia. Quali tra i seguenti segni e sintomi l'infermiere deve ricercare?	Tachipnea, tachicardia, ipotensione e oliguria	Polso tachicardico, cute secca, viso arrossato e tachipnea	Ipotensione posturale, occhi infossati, debolezza e viso arrossato	Confusione mentale, secchezza delle fauci, insonnia e irritabilità	INFERMIERISTICA GENERALE
651	Gli interventi più importanti di riduzione di stasi venosa agli arti inferiori e/o per l'incremento del ritorno venoso sono: (indicare la risposta ERRATA)	Posizionamento con le gambe giù dal letto	Compressione graduata pneumatica intermittente o con apparecchi ad impulsi per i piedi	Posizionamento di calze elastiche lunghe a compressione graduata	Esecuzione di esercizi agli arti inferiori e deambulazione precoce	INFERMIERISTICA GENERALE
652	Nel prelievo per emocoltura, con sistema chiuso Vacutainer, occorre riempire:	Prima il flacone per aerobi e poi quello per anaerobi	Per primo il flacone per cui è stata effettuata la richiesta dell'esame	E' indifferente quale flacone riempire per primo, l'importante è segnalarlo	Prima il flacone per anaerobi e poi quello per aerobi	INFERMIERISTICA GENERALE
653	In previsione dell'intervento chirurgico gli elementi del consenso informato sono rappresentati da:	Informazione, comprensione, volontarietà	Consenso del medico curante, accettazione dell'anestesia, consenso agli esami del pre - ricovero e consenso alla preparazione del sito chirurgico	Presa visione dei presidi, comprensione del tipo di anestesia, competenza e consenso alla tricotomia	Scelta del ricovero e consenso del parente	INFERMIERISTICA GENERALE
654	Devi recarti da un paziente posto in isolamento per Tubercolosi per rilevare la pressione arteriosa. Prima della procedura:	Esegui il lavaggio sociale delle mani o la frizione delle mani a base alcolica	Non è necessario lavarsi le mani in quanto è una procedura non invasiva	Esegui il lavaggio chirurgico delle mani	Per evitare il rischio di contagio, la rilevazione della Pressione Arteriosa sarà esclusivamente elettronica	INFERMIERISTICA GENERALE
655	Nella gestione del drenaggio pleurico, l'infermiere deve:	assicurarsi che i tubi siano pervi, controllare il materiale drenato, mantenere il sistema al di sotto del torace della persona	assicurarsi che il sistema sia aperto durante le manovre di riabilitazione respiratoria e sospendere l'aspirazione centralizzata	assicurarsi che tutto il sistema sia collegato all'aspirazione centralizzata, mantenere il sistema al di sopra del torace della persona	assicurarsi che tutti i tubi siano pervi, chiudere il drenaggio toracico e mantenerlo al di sopra del torace della persona	INFERMIERISTICA GENERALE
656	Quale tra le seguenti è da ritenere un'indicazione al confezionamento di una PEG?	Necessità di nutrizione enterale superiore alle quattro (4) settimane	Necessità di nutrizione enterale forzata superiore a cinque (5) giorni	Necessità di correggere squilibri idro-elettrolitici	Necessità di una dieta ipercalorica	INFERMIERISTICA GENERALE
657	Per prevenire sintomatologia gastro-intestinale in un paziente con nutrizione enterale si deve:	Somministrare la formula a temperatura ambiente	Somministrare la formula a una temperatura compresa tra i -4° e -8°C	Aumentare la frequenza dei lavaggi del sondino	Aumentare il volume di infusione formula	INFERMIERISTICA GENERALE
658	Il breakthrough pain o dolore episodico, in letteratura viene descritto con tre sottotipi (identificare la risposta sbagliata):	Dolore acuto	Dolore incidentale correlato a fattori precipitanti	Dolore spontaneo	Dolore di fine dose	INFERMIERISTICA GENERALE
659	Nello strumento per la misurazione del dolore Pain Assessment in Advanced Dementia Scale (PAINAD), di quale comportamento non viene richiesta la valutazione:	Cambiamenti nelle attività usuali	Espressioni facciali	Livello di consolazione del paziente	Respirazione	INFERMIERISTICA GENERALE
660	Non tutti i farmaci per os (= bocca) possono essere frantumati o divisi. Quali tra le seguenti compresse possono essere frantumate o divise:	Compresse con linea di pre-rottura	Compresse enteriche o formulazioni retard	Compresse a rilascio temporizzato	Compresse gastroresistenti e/o solubili solo in ambiente alcalino intestinale	INFERMIERISTICA GENERALE
661	Tra le seguenti sedi per l'iniezione intramuscolare quale permette di iniettare un quantitativo massimo di solo 1-2 ml:	Deltoidea	Dorsoglutea	Vastolaterale	Ventroglutea	INFERMIERISTICA GENERALE
662	Quale tra le seguenti NON è una strategia per la prevenzione delle infezioni del tratto urinario associate a catetere (CA-UTI):	Clampare il catetere prima della rimozione ed eseguire la ginnastica vescicale	Evitare l'esecuzione di irrigazioni vescicali	Evitare movimenti o trazioni uretrali tramite fissaggio del catetere alla coscia del paziente	Mantenere il sistema di drenaggio a circuito chiuso e non scollegare mai il catetere dal sistema di drenaggio	INFERMIERISTICA GENERALE
663	Ad un paziente con urostomia, quale tra le seguenti indicazioni dietetiche è consigliabile:	Bere almeno 2 litri di acqua al giorno	Evitare di assumere frutta e verdura	Assumere cibi ricchi di spezie e sale	Assumere cibi che contengono poca fibra, ma molti legumi	INFERMIERISTICA GENERALE
664	Rispetto a quale tipo di stomia le feci appaiono più formate e le defecazioni sono più regolari:	Sigmoidostomia	Ciecostomia	Ileostomia	Trasversostomia	INFERMIERISTICA GENERALE
665	Al fine di prevenire le infezioni del sito chirurgico il drenaggio deve:	Rimanere chiuso e unidirezionale	Essere dotato di un sistema aspirante	Creare una pressione positiva che assicura la raccolta del drenato senza che si contamini	Rimanere aperto e rimosso più tardi possibile	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

666	La sede principale di trasformazione dei farmaci è il:	fegato	cuore	polmone	rene	INFERMIERISTICA GENERALE
667	L'uso di ossigenoterapia iperbarica è indispensabile:	nelle embolie gassose	nell' infarto del miocardio	nella polmonite	nell'asma	INFERMIERISTICA GENERALE
668	Il massaggio cardiaco esterno si effettua:	sulla metà inferiore dello sterno	sulla metà superiore dello sterno	a livello dell'emitorace sinistro	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
669	Quale organo viene maggiormente colpito dopo l'impiego di emocomponenti?	Polmone	Reni	Cervello	Fegato	INFERMIERISTICA GENERALE
670	Nella misurazione della temperatura timpanica, qual'è la variabile che non può modificare l'attendibilità del risultato?	Ambiente esterno molto freddo	Presenza di cerume	Nessuna delle variabili presenti nelle altre opzioni di risposta modifica il risultato della misurazione della temperatura timpanica	Ambiente esterno molto caldo	INFERMIERISTICA GENERALE
671	Il glucagone iniettabile deve essere somministrato nei pazienti con:	Ipoglicemia grave, in stato di incoscienza	Ipoglicemia superiore a 200 mg/dl, in stato di incoscienza	Diabete tipo 1, con glicemia inferiore a 80 mg/dl	Ipoglicemia superiore a 300 mg/dl, indipendentemente dallo stato di coscienza	INFERMIERISTICA GENERALE
672	In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlate ad una aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:	Insegnare esercizi di respirazione profonda e tosse efficace	Somministrare per via endovenosa farmaci antibiotici ad ampio spettro	Ridurre al minimo il tasso di umidità ambientale	Far assumere un litro di acqua al giorno	INFERMIERISTICA GENERALE
673	La produttività può essere definita come:	Il risultato sia della razionalizzazione e dell'automazione del lavoro, che della scelta di un'organizzazione operativo-funzionale, di buona distribuzione di responsabilità e di opportune articolazioni di controllo	Il risultato di una maggior produzione in presenza di modifiche dei contratti collettivi di lavoro con prolungamento degli orari lavorativi	Il rapporto fra il costo annuo di funzionamento di una struttura e la qualità del servizio che produce	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
674	Il pioglitazone:	È un insulino-sensibilizzante per pazienti diabetici tipo2	Nessuna delle altre risposte è corretta	Non può essere associato a metformina e sulfaniluree	Non è somministrabile per via orale	INFERMIERISTICA GENERALE
675	La medicazione idrocolloidale:	Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione può facilitarne la crescita	Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata	Nessuna delle altre risposte è corretta	Aderisce alla superficie della ferita	INFERMIERISTICA GENERALE
676	È nota come morbo della mucca pazza:	Bse	Streptococcus suis	Trichinellosi	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
677	La Tachicardia sopraventricolare:	Non è immediatamente pericolosa per la vita, ma può influire sulla qualità di vita e dovrebbe essere valutata	Sono battiti cardiaci aggiuntivi occasionali, che possono originare dagli atri e a volte anche dai ventricoli	Nessuna delle altre risposte è corretta	È una situazione di emergenza perché porta nel breve a un arresto cardiovascolare	INFERMIERISTICA GENERALE
678	Le Extrasistoli:	Sono battiti cardiaci aggiuntivi occasionali, che possono originare dagli atri e a volte anche dai ventricoli	Si manifestano con un ritmo cardiaco rallentato	Si manifestano con un ritmo cardiaco rapido che spesso si manifesta sotto forma di crisi, con palpitazioni o battiti molto accelerati	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
679	Quale di queste affermazioni sul glicogeno è falsa?	Non può essere somministrato per via parenterale	È somministrata nelle crisi ipoglicemiche	Nessuna delle altre risposte è corretta	È sintetizzato tramite la tecnica del DNA ricombinante	INFERMIERISTICA GENERALE
680	In caso di rimozione accidentale della PEG (gastrostomia percutanea endoscopica) l'infermiere deve:	Mantenere pervio lo stoma applicando una sonda tipo Foley del calibro più simile a quello della sonda PEG e avvisare il medico di riferimento	Applicare una medicazione a piatto e inviare immediatamente l'assistito in pronto soccorso	Reinserire la stessa sonda entro 5/6 ore avendo cura di gonfiare bene il palloncino di ancoraggio	Applicare una medicazione a piatto e inviare l'assistito al servizio di endoscopia	INFERMIERISTICA GENERALE
681	La principale fra le iniziali manifestazioni della sindrome nefrosica è:	La proteinuria massiva	L'incremento dell'azoto ureico	L'ematuria microscopica o macroscopica	L'ipertensione arteriosa	INFERMIERISTICA GENERALE
682	In presenza di nitriti nelle urine, è opportuno eseguire:	Urinocoltura	Esame citologico delle urine	Raccolta delle urine delle 24 ore	Campione di urine standard	INFERMIERISTICA GENERALE
683	Quale tra i seguenti segni e sintomi non è tipico delle infezioni delle vie urinarie superiori?	Cefalea	Stranguria	Pollachiuria	Febbre	INFERMIERISTICA GENERALE
684	Per assistiti sottoposti a clistere evacuativo che non tollerano elevati volumi di liquidi, è opportuno utilizzare:	Soluzione ipertonica	Acqua di rubinetto	Soluzione fisiologica	Soluzione carminativa	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

685	Riguardo l'assistenza nella cura di sé di una persona che presenta ulcere degli arti inferiori, indicare la corretta sequenza di vero (V) e falso (F) per le seguenti affermazioni: - Valutare e registrare le caratteristiche dell'ulcera prima degli interventi assistenziali - L'irrigazione dell'ulcera, quando necessaria, può essere effettuata con acqua di rubinetto - L'asepsi non è necessaria - Le ulcere possono essere arteriose, diabetiche, reumatoidi o maligne.	V,V,V,V	V, F, V,V	V, F,F,V	F,F,F,F	INFERMIERISTICA GENERALE
686	Quali indicatori prende in esame la scala di Braden per la valutazione del rischio di ulcere da pressione?	Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento	Percezione sensoriale, esposizione all'umidità, grado di attività fisica, assunzione usuale di cibo	Corporatura, aspetto della cute, sesso ed età, continenza, mobilità, tipo di nutrizione, particolari elementi di rischio	Condizioni fisiche, stato mentale, deambulazione, mobilitazione, incontinenza	INFERMIERISTICA GENERALE
687	In caso di caduta accidentale di un anziano, l'infermiere:	Valuta lo stato di coscienza ed effettua una valutazione testa piedi	Alza l'anziano e chiede come si sente per accertarsi delle sue condizioni	Mette l'anziano in posizione laterale di sicurezza	Allerta sempre la rete dell'emergenza urgenza	INFERMIERISTICA GENERALE
688	Quanti ml di farmaco si possono somministrare al massimo con una iniezione intradermica?	2,5 ml	0,5 ml	3 ml	1 ml	INFERMIERISTICA GENERALE
689	L'alimentazione in un paziente disabile:	È correlata ai fabbisogni nutrizionali dell'ospite	Necessità sempre del coinvolgimento dell'ospite nella preparazione	Necessità di tempi stabiliti e precisi	Necessità di attenzioni come nella primissima infanzia	INFERMIERISTICA GENERALE
690	Quale tra le seguenti è un'alterazione della minzione?	Disuria	Oliguria	Poliuria	Anuria	INFERMIERISTICA GENERALE
691	Nelle manovre di primo soccorso, qual è la sequenza della valutazione del soggetto incosciente?	Coscienza - vie aeree - respirazione - circolazione	Circolazione - coscienza- respiro - traumi del rachide	Vie aeree - respirazione - circolazione- coscienza	Coscienza- circolazione - vie aeree - respirazione	INFERMIERISTICA GENERALE
692	L'ematemesi è:	Emissione di sangue attraverso la bocca proveniente dalle vie digerenti	Emissione di sangue attraverso la bocca proveniente dalla trachea	Emissione dalla bocca di vomito fecaloide	Emissione di espettorato denso attraverso la bocca proveniente dalle vie respiratorie	INFERMIERISTICA GENERALE
693	La contenzione fisica:	E' un trattamento terapeutico a cui ricorrere in ultima istanza	E' un trattamento riabilitativo che limita le scelte decisionali dell'assistito	Tutte le alternative sono corrette	E' un trattamento preventivo, che mira a limitare i danni potenzialmente arrecabili ad altri da parte dell'assistito	INFERMIERISTICA GENERALE
694	Il bilancio idrico si fa:	Per calcolare la quantità dei liquidi introdotti ed espulsi nelle 24 ore	Per calcolare la quantità di liquidi introdotti per via orale e parenterale	Esclusivamente per valutare la diuresi	Per valutare lo stato di idratazione del paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
695	I seguenti sono tutti fattori di rischio connessi alla disidratazione, tranne uno: quale?	Ipercolesterolemia	Iperpiressia	Ridotta mobilità e ridotta abilità funzionale	Deterioramento cognitivo	INFERMIERISTICA GENERALE
696	Le parestesie sono:	Sensazioni abnormi in assenza di stimolazione periferica generalmente sotto forma di formicolio o di punture	Un sintomo caratterizzato da assenza della contrazione riflessa	Contrazioni rapide di un gruppo di fibre muscolari, causati dall'attività spontanea di una o diverse unità motorie conseguenti a danni di vario tipo del motoneurone spinale	Un sintomo che esprime la difficoltà al rilassamento muscolare dopo la contrazione volontaria	INFERMIERISTICA GENERALE
697	Avendo a disposizione compresse da 0,25 mg, quante ne devono essere somministrate per ottenere un dosaggio da 0,125 mg?	Mezza	Una e mezza	3/4	Una	INFERMIERISTICA GENERALE
698	Con il termine ittero si intende l'aumento della concentrazione di:	Bilirubina nel sangue al quale consegue un caratteristico sintomo osservabile che è la colorazione giallastra delle sclere e/o dell'intera superficie cutanea	Urea nel sangue al quale consegue un caratteristico sintomo osservabile che è il prurito	Ammonio nel sangue al quale consegue un caratteristico stato di agitazione psico-motoria	Colesterolo nel sangue al quale caratteristico sintomo osservabile che è la colorazione giallastra delle sclere e/o dell'intera superficie cutanea	INFERMIERISTICA GENERALE
699	Nell'ipertensione ortostatica si osserva la riduzione della pressione sistolica, rispetto alla pressione in posizione supina o seduta, di almeno:	30 mmHg	10 mmHg	20 mmHg	40 mmHg	INFERMIERISTICA GENERALE
700	Indicare quale tra le seguenti non è una corretta azione da compiere, in caso di procedura di massaggio cardiaco esterno con un solo soccorritore.	Posizionare il paziente supino su di una superficie morbida	Nessuna delle altre risposte è corretta	Se l'individuo non risponde, seguire i protocolli per la gestione delle emergenze previsti dalla struttura. Se è presente una persona, mandarla a chiedere aiuto	Assicurare un'adeguata ventilazione	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

701	Quale tra le seguenti non rappresenta una possibile complicanza iniziale di una frattura?	Necrosi vascolare dell'osso	Sindrome compartimentale	Embolia grassosa	CID	INFERMIERISTICA GENERALE
702	Le seguenti sono tutte attenzioni che l'infermiere deve rivolgere all'assistito con disfagia, tranne una: quale?	Posizionamento del collare cervicale durante l'aiuto all'assunzione dei pasti	Effettuare l'igiene del cavo orale	Dopo il pasto, mantenere l'assistito in ortostatismo per 30-60 minuti	Somministrare la terapia farmacologica in corrispondenza dei pasti	INFERMIERISTICA GENERALE
703	Quali tra i seguenti è un sintomo dell'infiammazione:	Tutti quanti	Calore	Dolore	Rossore	INFERMIERISTICA GENERALE
704	La scala di Braden:	È uno strumento di valutazione del rischio lesioni da pressione	È uno strumento di valutazione della prognosi in pazienti gravemente debilitati	È uno strumento di valutazione del rischio cadute nell'anziano	È uno strumento di valutazione del rischio di cadute	INFERMIERISTICA GENERALE
705	Con riferimento alle lesioni cutanee secondarie, la crosta:	È la conseguenza di una lesione cutanea e del suo processo di riparazione, per il quale non andrebbe tolta troppo velocemente	È una zona della pelle che si assottiglia e in cui si ha perdita di elasticità e di colore	Nessuna delle altre risposte è corretta	È il risultato di un ammassamento di cellule morte che si sfaldano e che spesso lasciano sotto di sé uno strato eritematoso irritato tipico della psoriasi o della forfora	INFERMIERISTICA GENERALE
706	Qual è la manifestazione più immediata di un effetto tossico sulla gonade femminile?	Alterazioni del ciclo mestruale	Nessuna delle altre risposte è corretta	Mancata ovulazione	Perdite vaginali	INFERMIERISTICA GENERALE
707	L'articolazione dell'anca è:	Un'enantrosi	Una condiloartrosi	Un'articolazione a sella	Una diartrosi	INFERMIERISTICA GENERALE
708	L'aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato da:	Presenza di pigmenti biliari	Presenza di sangue	Disfunzionalità cardiocircolatorie	Elevata presenza di batteri	INFERMIERISTICA GENERALE
709	Quali fra i seguenti segni/sintomi non è osservabile in una persona depressa:	Logorrea	Aumento dell'affaticabilità	Alterazione del ritmo sonno/veglia	Ideazione rallentata e difficoltà nella concentrazione	INFERMIERISTICA GENERALE
710	L'approccio tecnico di terapia del dolore, può essere applicato nelle case residenza:	Solo se è aperto un percorso di fine vita	Solo per i pazienti terminali	Solo se vi è il consenso dei familiari	Per alleviare il dolore fisico e psichico dei pazienti	INFERMIERISTICA GENERALE
711	Riguardo l'assistenza nell'igiene perineale di un uomo, quale tra le seguenti affermazioni non è corretta?	Procedere a partire dalla base del pene con movimento circolare dalla periferia al centro fino al meato urinario	Scoprire delicatamente il prepuzio prima di effettuare la pulizia del glande	Al termine dell'igiene, il prepuzio deve essere riportato sul glande	Pulire lo scroto e il perineo per ultimi	INFERMIERISTICA GENERALE
712	La contenzione è uno strumento che:	Si può applicare previo prescrizione medica, salvo urgenze e dandone comunicazione tempestivamente al medico	Si può applicare solo previo prescrizione medica	Si può sempre applicare ai pazienti che ne abbiano necessità	È una estrema ratio che gli operatori socio sanitari possono sempre usare	INFERMIERISTICA GENERALE
713	Il test di Allen serve a:	Valutare la presenza del circolo arterioso collaterale	Valutare la presenza del circolo venoso collaterale	Nessuna delle altre risposte è corretta	Valutare la presenza del circolo artero venoso collaterale	INFERMIERISTICA GENERALE
714	Completare la seguente frase con l'opzione corretta: " Si definisce _____ l'arrossamento della pelle determinato dall'aumentato apporto di sangue ai vasi sanguigni del derma superficiale. "	Iperemia	Abrasione	Eczema	Erisipela	INFERMIERISTICA GENERALE
715	"Lesione a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma e i tessuti sottocutanei": questa è la definizione di una lesione da pressione di stadio:	III	IV	II	I	INFERMIERISTICA GENERALE
716	Una persona asintomatica affetta da covid 19 può trasmettere l'infezione?	Sì, le persone infette possono trasmettere il virus sia quando sono sintomatiche sia quando sono asintomatiche con lo stesso livello di trasmissibilità	Sì, ma solo dopo 72/96 ore dal contagio	Sì, ma solo se affetta anche da immunodepressione	Sì, ma solo se ha sviluppato immunoglobuline di tipo G	INFERMIERISTICA GENERALE
717	In caso di vene varicose agli arti inferiori, non è indicato:	permanere troppo a lungo in posizione sdraiata	posizionarsi con gli arti inferiori sollevati	evitare di mantenere per lungo tempo la posizione eretta	usare le calze elastiche	INFERMIERISTICA GENERALE
718	Nella gestione di un paziente che presenta disturbi d'ansia le strategie assistenziali di tipo relazionale più adeguate sono:	Stare vicino al paziente, favorire il contatto anche fisico, confortarlo e mostrarsi disponibili all'ascolto	Fare compagnia individuale	Assecondare ogni richiesta espressa dall'anziano	Proporre attività occupazionali	INFERMIERISTICA GENERALE
719	La somministrazione di un anestetico locale in forma di carbonato anziché cloridrato:	Migliora la durata d'azione anestetica	Causa tossicità sistemica	Peggiora la durata d'azione anestetica	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
720	Per il trattamento della stipsi l'uso dei lassativi favorenti la massa deve:	Essere supportato da un adeguato apporto di liquidi	Essere effettuato solo dopo la riduzione o sospensione della terapia sedativa	Tutte le alternative sono corrette	Essere supportato da una dieta ricca di proteine	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

721	Devi somministrare 15 milliequivalenti di Calcio gluconato hai a disposizione fiale da 10 ml contenenti 10 milliequivalenti. Quante fiale di farmaco devi aspirare?	Una e mezzo	Due	Una	Mezza	INFERMIERISTICA GENERALE
722	In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione laterale di sicurezza:	Perdita di coscienza atraumatica	Infarto miocardico acuto	Paziente gravemente ipoteso	Frattura della colonna	INFERMIERISTICA GENERALE
723	In caso di sindrome compartimentale, il tempo di reflusso capillare è superiore a:	3 secondi	7 secondi	1 secondo	5 secondi	INFERMIERISTICA GENERALE
724	Lo stato funzionale, valutato secondo le ADL, descrive la capacità di alimentarsi in modo autonomo. Quale tra le seguenti azioni è inclusa?	Porta il cibo dal piatto alla bocca	Taglia la carne	Organizza, prepara e serve i pasti in modo adeguato e senza aiuto	Scalda e serve pasti preparati	INFERMIERISTICA GENERALE
725	Il sonno non REM è suddiviso in:	4 stadi	2 stadi	3 stadi	5 stadi	INFERMIERISTICA GENERALE
726	Il Barthel index è:	Uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di base della vita quotidiana di una persona e quindi la sua autosufficienza	Uno strumento per valutare la performance dell'operatore nell'assistere la persona nelle attività quotidiane	Uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano	Un indice per determinare il rischio di disabilità in seguito ad ictus cerebrale	INFERMIERISTICA GENERALE
727	Indicare quale, tra le seguenti, è una possibile complicità del Morbo di Parkinson:	Stipsi	Stearrea	Diarrea	Melena	INFERMIERISTICA GENERALE
728	In ambito infermieristico, la contenzione è uno strumento che:	Si può applicare previo prescrizione medica, salvo urgenze	Si può applicare solo previo prescrizione medica	Si può sempre applicare ai pazienti che ne abbiano necessità	È una estrema ratio che gli operatori socio sanitari possono sempre usare	INFERMIERISTICA GENERALE
729	Qual è la sede di elezione per l'iniezione intramuscolare?	Vasto laterale	Deltoidica	Dorsoglutea	Ventroglutea	INFERMIERISTICA GENERALE
730	Le lesioni cutanee secondarie sono quelle che non compaiono inizialmente, ma derivano da modificazioni delle lesioni primarie. Ne costituisce esemplificazione:	Erosione	Papula	Placca	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
731	In quale fase febbrile il paziente presenta diaforesi?	Defervescenza	Insorgenza	In tutte le fasi	In nessuna delle fasi	INFERMIERISTICA GENERALE
732	Quale dei seguenti comportamenti non deve attuare un paziente sottoposto ad intervento di protesi totale d'anca:	Addurre la gamba	Mantenere le ginocchia separate	Posizionare un cuscino tra le gambe durante il sonno	Non flettere l'anca con angolazione maggiore di 90 gradi	INFERMIERISTICA GENERALE
733	I pazienti a rischio di alterazione della funzione cognitiva dovrebbero essere:	Incoraggiati a muoversi	Incoraggiati al riposo e alla riflessione	Sovrastimolati	Esclusi dal contatto con altre persone	INFERMIERISTICA GENERALE
734	La disinfezione come fase della medicazione delle lesioni da pressione:	Deve essere limitata ai casi di infezione o contaminazione critica	Ha un effetto completo se eseguita prima e dopo la detersione	Deve essere sempre adottata	Ha un effetto completo se le soluzioni utilizzate non vengono rimosse dopo l'applicazione	INFERMIERISTICA GENERALE
735	E' più corretto detergere la stomia con:	Acqua potabile	Soluzioni isotoniche	Nessuna delle altre risposte è corretta	Soluzione fisiologica sterile	INFERMIERISTICA GENERALE
736	La nutrizione parenterale una volta preparata:	Deve essere somministrata subito	Deve essere somministrata entro 12 ore	Deve essere somministrata entro 24 ore appena tolta dal frigorifero	Deve essere somministrata entro 24 ore e deve essere conservata in frigorifero	INFERMIERISTICA GENERALE
737	In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l'emogluco-test è indicato:	Eliminare la prima goccia di sangue ed utilizzare la seconda per l'analisi	Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi	Pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito	Pungere dopo aver accuratamente disinfettato con iodopovidone la zona da pungere	INFERMIERISTICA GENERALE
738	Che cosa indica esattamente il termine bradicinesia?	Lentezza di movimento	Assenza di movimento	Nessuna delle altre risposte è corretta	Incapacità di programmazione motoria	INFERMIERISTICA GENERALE
739	Lo shock ipovolemico si accompagna:	A diminuzione della pressione arteriosa	Nessuna delle altre risposte è corretta	A dolore precordiale	Ad aumento della pressione arteriosa	INFERMIERISTICA GENERALE
740	In un malato che presenta dispnea occorre:	Posizionare in decubito semiortopedico, tranquillizzarlo ed applicare ossigenoterapia 2L/min	Metterlo a riposo supino ed applicare ossigenoterapia con maschera di venturi arterioso)	Tranquillizzare il malato e provvedere subito per l'Emogasanalisi (prelievo arterioso)	Valutare il tipo di dispnea e invitarlo a restare sdraiato per non affaticarsi	INFERMIERISTICA GENERALE
741	Come ti aspetti di trovare la frequenza cardiaca, in caso di repentino abbassamento pressorio?	Aumentata rispetto alla norma	Diminuita rispetto alla norma	Nei range di normalità	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
742	Se somministri un farmaco tramite peg è necessario:	Lavare il sondino prima e dopo la somministrazione con acqua	Mettere il farmaco all'interno della sacca d'alimentazione	Valutare prima il ristagno	Sospendere l'infusione almeno 15 minuti prima della somministrazione della terapia	INFERMIERISTICA GENERALE
743	Tra le raccomandazioni generali nella gestione del catetere vescicale è importante:	Non sbracciare mai il circuito	Effettuare frequenti lavaggi del sistema attraverso l'uso di una siringa cono catetere (schizzettone)	Posizionare il catetere sempre più in alto della vescica	Effettuare frequenti indagini diagnostiche su campioni di urina prelevati dalla borsina di raccolta	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

744	Devo somministrare Levodopa 62,5 mg ad un paziente. Ho a disposizione compresse divisibili da 250 mg. Quanto ne dovrò somministrare al paziente?	1/4 compressa	2 + 1/2 compressa	1/2 compressa	1 compressa	INFERMIERISTICA GENERALE
745	Il peridon:	Causa ipeprolattinemia	Non causa iperprolattinemia	Non causa ginecomastia	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
746	Quale tra i seguenti interventi per la dispersione del calore utilizza la conduzione:	Applicare ghiaccio in corrispondenza dei grandi vasi arteriosi	Aerare la stanza	Eseguire spugnature al paziente	Scoprire il paziente	INFERMIERISTICA GENERALE
747	La prevenzione di lesione da pressione si svolge con:	Movimentazione frequente dell'ospite	Uscite all'aria aperta	Frequenti bagni caldi	Dieta iperproteica	INFERMIERISTICA GENERALE
748	Per disartria si intende:	Un disturbo del linguaggio di tipo motorio: consiste nella difficoltà ad effettuare movimenti necessari per l' articolazione della parola	L'incapacità di compiere gesti coordinati e diretti ad un determinato fine sebbene siano mantenute inalterate la volontà del soggetto e le sue capacità motorie	Un disturbo della deambulazione: il soggetto compie movimenti lenti ed imprecisi	L' incapacità di costruire frasi di senso compiuto	INFERMIERISTICA GENERALE
749	Se noti feci miste a grassi si tratta di:	Feci steatorroiche	Feci colliquate	Melena	Feci ematiche	INFERMIERISTICA GENERALE
750	Un paziente ti chiama perché avverte un forte stimolo ad evacuare ma non riesce ad espellere nulla. Che fai?	Verifico se presenta addome teso e globoso, effettuo esplorazione rettale per verificare la presenza di feci molli in ampolla e se presenti effettuo un clistere evacuante	Verifico se presenta addome teso e globoso, controllo da quanto tempo non evacua, gli suggerisco di sforzarsi a spingere e se non riesce comunque ad evacuare effettuo clistere evacuante a grande volume	Lo accompagno in bagno e lo lascio sul water incitandolo a provare a spingere	Gli somministro lassativo per bocca	INFERMIERISTICA GENERALE
751	Quale tra i seguenti dati è indicativo di sindrome da immobilizzazione:	Edemi	Poliuria	Ipertermia	Ipertensione	INFERMIERISTICA GENERALE
752	Se un paziente portatore di catetere vescicale presenta 300 ml di diuresi / 24 ore di quale alterazione si tratta?	Oliguria	Disuria	Anuria	Pollachiuria	INFERMIERISTICA GENERALE
753	Quando nell'espettorato trovi piccole quantità di sangue sei di fronte a:	Emoftoe	Espettorato mucopurulento	Emottisi	Espettorato sieroso	INFERMIERISTICA GENERALE
754	A cosa serve rilevare la saturazione?	Riconoscere precocemente l'ipossia rispetto alla condizione di cianosi	Tutte le alternative sono corrette	Valutare il tipo di dispnea che presenta il paziente	Riconoscere un'insufficienza cardiaca grave	INFERMIERISTICA GENERALE
755	Un paziente in trattamento con anticoagulante orale presenta un tp con INR di 6.2, cosa fai?	Avviso immediatamente il medico in quanto il paziente è ad alto rischio di emorragia	Nulla in quanto il valore è nei range di normalità	Avviso immediatamente il medico in quanto il paziente è ad alto rischio di tvp	Favorisco la somministrazione di alimenti ricchi di ferro	INFERMIERISTICA GENERALE
756	Quali sono le sedi di rilevazione del polso che sceglieresti in caso di grave ipotensione?	Carotideo	Radiale e carotideo	Nessuna delle altre risposte è corretta	Radiale, temporale	INFERMIERISTICA GENERALE
757	Un paziente presenta un arto inferiore freddo e pallido, tenti di rilevare il polso pedidio, ma è assente: cosa potrebbe essere successo?	Ostruzione acuta del flusso arterioso	Probabile frattura del terzo metatarso	Ostruzione acuta del flusso venoso	Nevrite acuta del nervo sciatico	INFERMIERISTICA GENERALE
758	La rifampicina:	È un antibiotico battericida	Non è assorbita nell'intestino	Nessuna delle altre risposte è corretta	Non è usato per la tubercolosi	INFERMIERISTICA GENERALE
759	Quali tra questi non è un effetto del progesterone?	Riduzione della risposta insulinica al glucosio	Modifiche a livello della mucosa endometriale	Inibizione dell'attività contrattile dell'utero	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
760	Indicare la corretta sequenza di azioni da compiere per la somministrazione della nutrizione enterale (NE): 1. raccordare il set al SNG 2. impostare la velocità di infusione nel sistema scelto 3. controllare la scadenza del prodotto e agitare il flacone 4. effettuare il lavaggio del SNG al termine dell'infusione con 30-50 cc di acqua 5. applicare il set alla pompa 6. raccordare il set infusionale al flacone, evitando di trasferire i prodotti in altri flaconi	3,6,5,1,2,4	2,6,3,5,4,2	1,4,3,2,6,5	3,5,4,1,2,6	INFERMIERISTICA GENERALE
761	Matteo, 13 mesi, è ricoverato per diarrea acuta, vomito e febbre, calo ponderale 10%. Si diagnostica una gastroenterite da Rotavirus. Il candidato indichi quali dei seguenti dati rileva con priorità.	Peso, turgore della cute, dolore addominale, diuresi	Nessuna delle altre risposte è corretta	Ultimo pasto assunto	Altri famigliari con episodi recenti di febbre	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

762	I sali di litio:	Sono usati nel disturbo bipolare	Sono usati nella disfunzione erettile	Sono usati come antivirali	Sono usati per la pulizia degli strumenti impiegati per la preparazione dei pasti	INFERMIERISTICA GENERALE
763	Quale di questi è più utile nella diagnosi di iper o ipotiroidismo?	Dosaggio diretto del TSH	Dosaggio del TRH	Dosaggio dell'ACTH	Dosaggio differenziato	INFERMIERISTICA GENERALE
764	La scopolamina è:	Un farmaco ad attività neurotrofa con azione anti-vertigine	Un farmaco che aumenta l'attività sintetica dei neuroni dei nuclei vestibolari	Nessuna delle altre risposte è corretta	Un farmaco ad azione vasotropa con azione anti-vertigine	INFERMIERISTICA GENERALE
765	Il mifepristone è:	Un antagonista del progesterone	Un eccitante della crescita	Un agonista del progesterone	Un beta bloccante	INFERMIERISTICA GENERALE
766	Un soggetto viene accompagnato al Pronto Soccorso a seguito di un incidente. L'esame neurologico è: apertura degli occhi agli stimoli verbali, risposta verbale confusa, risposta motoria localizza gli stimoli dolorosi. Secondo la scala di Glasgow (GCS) lo score è:	Punti 12; risposta oculare (punti 3), risposta verbale (punti 4), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 5)	Punti 11; risposta oculare (punti 4), risposta verbale (punti 4), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 3)	Nessuna delle altre risposte è corretta	Punti 15; risposta oculare (punti 5), risposta verbale (punti 5), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 5)	INFERMIERISTICA GENERALE
767	In area critica TAH significa:	Heart	Hedge	High	Hedge	INFERMIERISTICA GENERALE
768	Quale azione non deve essere compiuta durante la procedura di "applicazione di una trazione trans-scheletrica"?	Non posizionare il paziente in allineamento	Fornire assistenza ai punti di inserzione dei fili trans-scheletrici. Fornire assistenza ai punti di inserzione dei fili trans-scheletrici	Garantire la privacy del paziente	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
769	Il termine diuresi indica:	Urina prodotta in un determinato periodo di tempo	Minzione difficoltosa	Nessuna delle altre risposte è corretta	Presidio utilizzato per rimuovere (fare uscire) liquidi	INFERMIERISTICA GENERALE
770	Quale sistema si attiva iniziando un'attività motoria dispendiosa correlata alla necessità di ridurre il coinvolgimento dell'apparato digerente?	Sistema Simpatico	Sistema Differenziale Nervoso	Sistema Parasimpatico	Sistema Nervoso Somatico	INFERMIERISTICA GENERALE
771	Il test della coagulasi è utilizzato per la differenziazione di:	Stafilococchi	Streptococchi	Nessuna delle altre risposte è corretta	Lieviti	INFERMIERISTICA GENERALE
772	L'angina:	Si manifesta quando l'ossigeno fornito al miocardio è insufficiente	Nessuna delle altre risposte è corretta	Quando si manifesta provoca un dolore che non riguarda il petto	Si manifesta quando l'ossigeno fornito al miocardio è sufficiente	INFERMIERISTICA GENERALE
773	Un soggetto viene accompagnato al Pronto Soccorso a seguito di un incidente. L'esame neurologico è: risposta oculare spontanea, risposta verbale orientata/appropriata, risposta motoria obbedisce al comando. Secondo la scala di Glasgow (GCS) lo score è:	Punti 15; risposta oculare (punti 4), risposta verbale (punti 5), risposta motoria (punti 6)	Punti 13; risposta oculare (punti 3), risposta verbale (punti 5), risposta motoria (punti 5)	Nessuna delle altre risposte è corretta	Punti 12; risposta oculare (punti 3), risposta verbale (punti 4), risposta motoria (punti 5)	INFERMIERISTICA GENERALE
774	Quale infestazione cutanea causata dall'acaro Sarcoptes scabiei, si basa sull'esame obiettivo e sulla scarificazione e prevede come trattamento l'uso di scabicide topici o, talvolta, di ivermectina orale?	Scabbia	Rosolia	Meningite	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
775	Come deve avvenire il massaggio cardiaco esterno?	Comprimendo lo sterno contro il rachide, la linea di pressione deve essere verticale	Nessuna delle altre risposte è corretta	Comprimendo la colonna vertebrale, posteriormente all'altezza del cuore, la linea di pressione deve essere diagonale	Comprimendo la faringe con due dita, la linea di pressione deve essere verticale	INFERMIERISTICA GENERALE
776	L'isoflurano:	Può essere associato all'adrenalina	Causa epatotossicità maggiore rispetto ad altri	Non irrita la mucosa	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
777	Quale tra questi termini definisce un aumento della variabilità delle dimensioni dei Globuli Rossi?	Anisocitosi	Schistocitosi	Poichilocitosi	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
778	Gli effetti teratogeni da sostanze chimiche sono:	Dipendenti dalla dose	Dipendenti dall'ambiente	Indipendenti dalla dose	Indipendenti dalla specie	INFERMIERISTICA GENERALE
779	Indicare l'enzima il cui aumento è più indicativo di danno epatico acuto:	ALT (alanina aminotransferasi)	CPK (creatin fosfochinasi)	Enzima H+	ALP (fosfatasi alcalina)	INFERMIERISTICA GENERALE
780	Con riferimento alla procedura di "assistenza al paziente che manifesta convulsioni", indicare quale azione, fra le seguenti, deve essere effettuata per prima.	Se il paziente non è a letto assisterlo, sul pavimento, proteggendo la testa nel proprio grembo o su un cuscino		Aprire i vestiti intorno al collo e al torace	Osservare l'andamento dell'attacco convulsivo, annotare la sequenza e il tipo di movimento degli arti. Osservare il colore della cute. Quando l'attacco finisce, controllare la frequenza del polso e del respiro	INFERMIERISTICA GENERALE

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

781	Il tempo indicato per la trasfusione di una sacca di piastrine (80 cc.) è:	Circa 5 - 10 minuti	Circa 200 ml / h	Maggiore di un'ora	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
782	Qual è la caratteristica delle enterotossine da stafilococchi aureus:	Termo-resistenza	Crio-resistenza	Crio-labilità	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
783	Il ph del succo gastrico è compreso tra:	1 e 2	7 e 8	10 e 20	5 e 6	INFERMIERISTICA GENERALE
784	Quali caratteristiche funzionali deve presentare un anestetico locale per essere utilizzato?	Avere bassa tossicità	Causare sonnolenza	Essere irritante per il sito in cui viene applicato	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA GENERALE
785	L'insulina:	È rilasciata dalle cellule beta del pancreas	Nessuna delle altre risposte è corretta	È rilasciata dalle cellule alfa del pancreas	È rilasciata dalle cellule delta del pancreas	INFERMIERISTICA GENERALE
786	Lo stato di anestesia ideale prevede:	Perdita di tutte le sensazioni compresa analgesia e rilassamento muscolare	Attivazione dei neuroni del sistema nervoso	Nessuna delle altre risposte è corretta	Perdita di tutte le sensazioni tranne analgesia	INFERMIERISTICA GENERALE
787	Quale dei seguenti bendaggi può essere delegato all'operatore socio sanitario?	Semplice	Semplice e complesso	Complesso	Incrociato a doppio nodo	INFERMIERISTICA GENERALE
788	Le lesioni cutanee primarie sono quelle che compaiono inizialmente in risposta ad alcuni cambiamenti nell'ambiente esterno o interno della cute. Ne costituisce esemplificazione:	Pustola	Linfonodo	Erosione	Cicatrice	INFERMIERISTICA GENERALE