

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

Id	Quesito	Risp_ esatta	Risp_errata_1	Risp_errata_2	Risp_errata_3	Materia
1351	Quale delle seguenti patologie è a trasmissione diretta tra individui?	Sifilide	Peste	Rabbia	Malaria	IGIENE
1352	In caso di ferita traumatica e in assenza di conoscenza dello stato vaccinale, la profilassi antitetanica prevede:	tutte le altre risposte sono corrette	disinfezione della ferita	somministrazione di immunoglobuline	terapia antibiotica	IGIENE
1353	La chemioprophilassi primaria prevede la somministrazione di:	antibiotici	vaccini	fans	qualsiasi farmaco antivirale	IGIENE
1354	Con la refrigerazione gli alimenti vengono conservati a temperatura:	tra 0°C e 4°C	ambiente	< 0°C	> 4°C	IGIENE
1355	Completare la seguente frase con l'opzione corretta: "Un oggetto si definisce sterile quando è privo di _____"	qualsiasi microrganismo o spora	spore	microrganismi patogeni	microorganismi anaerobi	IGIENE
1356	Classifichiamo il lisoformio come:	un disinfettante	un insetticida	un battericida	un acaricida	IGIENE
1357	Il botulismo è classificato come:	un'intossicazione alimentare	un avvelenamento da funghi	un'epatite a eziologia sconosciuta	un'infezione in seguito a intervento chirurgico	IGIENE
1358	Identifica il vettore di infezione tra i seguenti:	mosche	aria	alimenti	suolo	IGIENE
1359	Cosa si intende per contumacia:	il confino di un paziente in ambiente domiciliare o ospedaliero per un determinato periodo di tempo	l'obbligo per il paziente di sottoporsi a profilassi antibiotiche	la mancata presentazione della certificazione medica al datore di lavoro	la dimissione di un paziente dalla struttura ospedaliera	IGIENE
1360	La Rickettsiosi è un'infezione che utilizza come vettore:	la zecca	il cane	i molluschi	la zanzara	IGIENE
1361	Quale dei seguenti vaccini è costruito con frazioni di microrganismi:	Antipertosse	Antimalarico	Antirosolia	Antitubercolare	IGIENE
1362	Quando non si può somministrare un vaccino?	Durante terapia immunosoppressiva	Durante terapia antifungina	Durante l'adolescenza	Durante l'allattamento	IGIENE
1363	Quale dei seguenti elementi chimici deve essere assente nell'acqua potabile?	Argento	Calcio	Magnesio	Potassio	IGIENE
1364	Quale malattia è stata eradicata a livello mondiale?	Vaiolo	Micobatteriosi	Peste	Lebbra	IGIENE
1365	Per quale malattia a tutt'oggi non esiste ancora un vaccino?	Toxoplasmosi	Epatite virale B	Epatite A	Morbillo	IGIENE
1366	Per la sterilizzazione viene utilizzato:	ossido di etilene	alcol etilico	acido cloridrico	cloro	IGIENE
1367	Una malattia infettiva è a trasmissione eterogenea se:	necessita di un vettore	ha differenti manifestazioni cliniche	colpisce organismi di specie diverse	si trasmette con diverse modalità	IGIENE
1368	Da cosa può essere provocata la tossinfezione alimentare:	staphylococcus aureus	treponema pallidum	VZV	micobatteri ambientali	IGIENE
1369	In quale tipo di prevenzione si effettua il monitoraggio periodico fetale?	Secondaria	Terziaria	Tutte le altre risposte sono corrette	Primaria	IGIENE
1370	La profilassi indiretta viene attuata mediante:	disinfestazione ambientale	isolamento	inchiesta epidemiologica	notifica	IGIENE
1371	Quale tra i seguenti è un composto alogeno?	Cloro	Aldeidi	Acqua distillata	Alcool	IGIENE
1372	La temperatura ottimale per un individuo sano a riposo è:	18-20°C	25-29°C	21-25°C	14-16°C	IGIENE
1373	In seguito a pastorizzazione, per quanto tempo si conserva il latte in frigorifero?	4 giorni	7 giorni	2 giorni	3 giorni	IGIENE
1374	In caso di immunoprofilassi passiva cosa viene somministrato al paziente?	Immunoglobuline	Immunosoppressori	Eristrociti	Chemioterapici	IGIENE
1375	Per definizione che cos'è un'autoclave?	Una caldaia usata per la sterilizzazione	Una macchina per distruggere i rifiuti	Un carrello per il trasporto della biancheria	Un'autoambulanza dotata di lettiga automatizzata	IGIENE
1376	Il periodo di incubazione di una malattia indica l'arco di tempo tra:	il contagio dell'agente patogeno e la manifestazione dei sintomi correlati	il contatto con l'agente patogeno e la risposta del sistema immunitario	l'inizio dei sintomi e la guarigione definitiva	il momento in cui l'agente patogeno entra nell'organismo e la guarigione	IGIENE
1377	Prima di effettuare un prelievo di sangue venoso si deve disinfettare la parte interessata per almeno:	uno o due minuti	cinque minuti	tutte le altre risposte sono corrette	quattro secondi	IGIENE
1378	Cosa si utilizza per la disinfezione di strumenti endoscopici:	la glutaraldeide	la bollitura	l'autoclave	l'acido fenico	IGIENE
1379	Che cosa si intende per antisepsi?	Disinfezione di tessuti viventi	Disinfezione della sala operatoria	Sterilizzazione di tessuti vegetali	Sterilizzazione di strumentario chirurgico	IGIENE
1380	Qual è la caratteristica di una malattia endemica?	Ha frequenza costante	E' ad eziologia sconosciuta	Si trasmette geneticamente	Presenta bruschi aumenti di frequenza in tempi brevi	IGIENE
1381	Quale delle seguenti malattie ha bisogno di un vettore per diffondersi?	Malaria	Polmonite	Rosolia	Epatite A	IGIENE
1382	Tra le seguenti malattie quale può porre nella condizione di portatore cronico?	Epatite B	Toxoplasma	Rosolia	Malaria	IGIENE
1383	La clorexidina viene classificata come:	un disinfettante	una vitamina	un antimicotico	un agente sterilizzante	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1384	L'isolamento del paziente è obbligatorio in caso di:	Tubercolosi	Malaria	Polmonite da P. carinii	Aids	IGIENE
1385	Per quale tipo di sterilizzazione si utilizzano i raggi UV?	Di superfici varie	Di biancheria e garza	Della cute e delle mucose	Del cavo orale	IGIENE
1386	La cosiddetta malattia di Lyme può essere trasmessa da:	zecche	mosche tse-tse	zanzare	pulci	IGIENE
1387	Vetro o metallo si sterilizzano mediante:	stufe a secco	fenoli	alcoli	bollitura	IGIENE
1388	Un vaccino può essere composto da:	tutte le altre risposte sono corrette	microrganismi morti	microrganismi attenuati	anatossine	IGIENE
1389	I rifiuti ospedalieri si definiscono?	Speciali	Velenosi	Umidi	Tossici	IGIENE
1390	Cosa non fa parte della prevenzione primaria?	Screening di massa	Vaccinazione	Disinfezione	Educazione sanitaria	IGIENE
1391	Una sola di queste malattie non è trasmissibile per via aerea. Quale?	Epatite A	Varicella	Tubercolosi	Scarlattina	IGIENE
1392	Quale delle seguenti malattie è anche a trasmissione verticale?	Rosolia	Amebiasi	Polmonite	Bronchiolite	IGIENE
1393	Il guanto sterile non va indossato:	Prima del posizionamento del sondino naso gastrico	Prima della medicazione del catetere arterioso	Prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica	Prima del posizionamento del catetere vescicale	IGIENE
1394	L'utilizzo dei guanti è una misura:	aggiuntiva al lavaggio delle mani	alternativa al lavaggio sociale delle mani	alternativa al lavaggio antisettico delle mani	alternativa al lavaggio chirurgico delle mani	IGIENE
1395	Quando NON deve essere utilizzata la frizione con soluzione alcolica delle mani?	Se le mani sono imbrattate di sangue	Dopo il contatto con oggetti inanimati	Dopo la rimozione dei guanti	Se le mani non sono visibilmente sporche	IGIENE
1396	Tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo NON vanno eliminati:	farmaci scaduti	agenti chimici pericolosi	liquidi radiologici	contenitori medicinali citotossici	IGIENE
1397	La glutaraldeide viene utilizzata per la sterilizzazione di:	endoscopi	garze e batuffoli	stetoscopi	fonendoscopi	IGIENE
1398	Fra i comportamenti da tenere nel rifacimento letto, quale, tra i seguenti, è corretto:	Rimuovere dal letto le lenzuola e deporle nel cesto della biancheria sporca tenendole lontano dalla divisa	Rimuovere la biancheria dal letto, tenendola lontano dalla divisa e adagiandola momentaneamente sul pavimento in attesa di riporla nell'apposito sacco al termine della procedura	Rimuovere la biancheria dal letto, scuoterla per eliminare i microrganismi, tenendola lontano dalla propria divisa e successivamente deporla nel cesto della biancheria sporca	Rimuovere la biancheria dal letto tenendola adesa al proprio corpo e scuotendola prima di riporla nel sacco della lavanderia	IGIENE
1399	Durante l'esecuzione dell'igiene intima femminile è corretto procedere:	Versando l'acqua sui genitali pulire le grandi labbra e successivamente le piccole labbra	Versando l'acqua sui genitali pulire in senso lineare dalla zona anale alla vagina	Versando l'acqua sui genitali pulire in senso lineare dalla zona vaginale al meato urinario	Versando l'acqua sui genitali pulire le piccole labbra e successivamente le grandi labbra	IGIENE
1400	Al termine dell'esecuzione dell'igiene intima maschile, è importante ricoprire il glande per:	prevenire formazione di edema	evitare l'imbarazzo della persona	prevenire infezioni	prevenire infiammazioni	IGIENE
1401	Durante l'igiene del cavo orale del paziente incosciente, il paziente va posizionato:	Sul fianco e sollevando la testata del letto di almeno 30 gradi	Sul fianco non sollevando la testata del letto	Supino sollevando la testata del letto di almeno 45 gradi	Supino sollevando la testata del letto di almeno 30 gradi	IGIENE
1402	Le seguenti sono tutte complicanze che derivano da un'inadeguata attenzione nella pulizia del letto, tranne una: quale?	Difficoltà nel movimento a letto	Ulcere da pressione	Sensazione di disagio	Irritazioni cutanee	IGIENE
1403	Riguardo l'igiene del cavo orale di una persona non cosciente, quali tra le seguenti affermazioni sono esatte? 1. Controllare che l'aspiratore sia funzionante e nei pressi 2. Posizionare la persona seduta 3. Utilizzare le dita della mano non dominante per tenere aperta la bocca 4. Cospargere con un agente idratante le labbra dopo aver completato l'igiene orale.	1,4	1,2,3,4	1,2,4	2,3	IGIENE
1404	Che tipo di lavaggio va effettuato prima di indossare i guanti sterili per l'inserimento di un catetere vescicale?	Lavaggio sociale	Lavaggio chirurgico	Nessuna delle altre risposte è corretta	Lavaggio antisettico	IGIENE
1405	Lavare le mani non basta per favorire la prevenzione, questa azione deve essere accompagnata da alcuni accorgimenti:	Le unghie devono essere tenute corte e pulite	Le unghie possono essere ricoperte da smalto solo se di colore chiaro	Nessuna delle altre risposte è corretta	Le unghie possono essere ricoperte da smalto antibatterico	IGIENE
1406	La rosolia è una malattia di natura:	virale	genetica	sia virale che batterica	batterica	IGIENE
1407	I Batteri sono:	microorganismi che possono causare infezioni	microorganismi con cellula molto complessa	microorganismi sempre pericolosi	microorganismi che vivono solo in assenza di ossigeno	IGIENE
1408	L'epatite è una affezione che riguarda:	il fegato	il pancreas	il cuore	il colon retto	IGIENE
1409	La toxoplasmosi è una malattia:	sia dell'uomo che degli animali	solo dell'uomo	solo dei gatti	solo degli animali	IGIENE
1410	Il periodo di incubazione dell'epatite A è di:	circa un mese	circa tre mesi	circa un anno	circa sei mesi	IGIENE
1411	L'acronimo AIDS significa:	Acquired Immuno Deficiency Syndrome	Acquired Immuno Deficity Syndrome	Acquired In Deficit Syndrome	Acquired Immuno Deficiency Sistem	IGIENE
1412	La malaria è una malattia:	che ha recidive e può diventare cronica	che non ha recidive	che ha recidive ma non può diventare cronica	che raramente ha recidive	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1413	La penicillina si ricava:	da un fungo	da un batterio	da una pianta	da un virusa	IGIENE
1414	La comune meningite dei bambini è causata da:	un virus	un fungo	un protozoo	un batterio	IGIENE
1415	I soggetti portatori sani di una malattia:	non manifestano la malattia ma possono trasmetterla	non hanno la malattia	non manifestano la malattia e non possono trasmetterla	manifestano la malattia	IGIENE
1416	Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere:	Il lavaggio delle mani	Il ricambio quotidiano della biancheria del letto	La dotazione di disinfettanti e antibiotici	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1417	Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:	Prima di indossarli e dopo averli rimossi	Solo quando evidentemente contaminate	Solo se si è venuti a contatto con liquidi organici	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1418	Qual è il più importante fattore di rischio per lo sviluppo di una batteriuria associata a cateterizzazione?	La durata della cateterizzazione	Una scorretta igiene perineale	L'inadeguata assunzione di liquidi	L'utilizzo di cateteri vescicali in lattice	IGIENE
1419	Al termine di un'iniezione, l'infermiere deve gettare siringa e ago:	Negli appositi contenitori senza rimettere il cappuccio protettivo sull'ago	Solo dopo aver reincappucciato l'ago	Tutte le altre alternative sono corrette	Nei rifiuti speciali solo dopo aver reincappucciato l'ago	IGIENE
1420	Per "antiasepsi" si intende:	Un insieme di norme atte a impedire o a rallentare la moltiplicazione di germi patogeni e non patogeni	Un processo che permette l'eliminazione di ogni microrganismo vivente (batteri, spore, miceti e virus)	Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili	La detersione eseguita mediante l'uso di mezzi e sostanze ad alto potere detergente	IGIENE
1421	La dieta del paziente affetto da insufficienza renale cronica non sottoposto a dialisi deve:	Limitare l'apporto di potassio	Aumentare la quota di liquidi	Limitare l'apporto di grassi saturi	Limitare l'apporto di proteine	IGIENE
1422	L'uso dei guanti monouso:	Non deve mai essere un'alternativa all'igiene delle mani	Può essere un'alternativa all'igiene delle mani in alcune situazioni	E' una valida alternativa all'igiene delle mani	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1423	L'accertamento dello stato nutrizionale prevede la raccolta dei seguenti dati OGGETTIVI:	Misure antropometriche	Ambiente	Abitudini di vita	Religione	IGIENE
1424	La procedura più importante per prevenire le infezioni correlate all'assistenza infermieristica:	Igiene delle mani	Utilizzo di battericidi	Sterilizzazione degli ambienti	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1425	Quale fra le seguenti manovre è indicata per prevenire lo sviluppo di infezioni alle vie urinarie nel paziente portatore di catetere vescicale?	Utilizzare un sacchetto di raccolta sterile, munito di apposita valvola per lo svuotamento	A ogni svuotamento del sacchetto di raccolta, disconnettere il circuito e lavare l'interno del sacchetto con acqua distillata	Non svuotare mai il sacchetto di raccolta, ma sostituirlo con uno nuovo ogni volta che si riempie	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1426	Qual è la modalità corretta di detersione della ferita chirurgica?	Procedere sempre dall'area pulita verso l'area più sporca	Procedere dall'alto verso il basso	Per convenzione si procede sempre da sinistra verso destra	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1427	Per prevenire l'insorgenza del piede diabetico la persona deve essere educata a:	Asciugare bene fra le dita con un panno morbido	Lavare i piedi una volta alla settimana con soluzione alcalina	Lavare i piedi con acqua molto calda	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1428	Qual è il materiale biologico più utile per la diagnosi microbiologica di tubercolosi polmonare?	L'espettorato	La saliva	Il sangue	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1429	Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira principalmente a prevenire:	Le infezioni ospedaliere	La trasmissione di agenti virali	Le infezioni respiratorie	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1430	Per aiutare un paziente ad espettorare le secrezioni catarrali è utile:	Associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse	Farlo tossire frequentemente, sia di giorno che di notte	Invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso anteriormente	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1431	Durante la somministrazione di nutrizione tramite PEG, il paziente:	Deve mantenere la postura semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30/40 gradi	Non può deglutire liquidi per OS	Necessita di un controllo della glicemia almeno ogni 2 ore	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1432	In ambito infermieristico, l'uso dei guanti:	Non deve mai essere un'alternativa all'igiene delle mani	È una valida alternativa all'igiene delle mani	Non deve necessariamente essere seguito dall'igiene delle mani	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1433	Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale?	Le infezioni	Il vomito	La disidratazione	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1434	Per ottenere l'effetto desiderato dei disinfettanti si devono osservare regole ben precise. Quale tra i seguenti sistemi di conservazione NON è corretto?	Lasciare aperta la confezione	Apporre la data di apertura sulla confezione	Conservare il prodotto in luoghi freschi e asciutti	Tutte le risposte sono corrette	IGIENE
1435	Qual è la misura che riduce sensibilmente l'incidenza di infezioni nella cateterizzazione urinaria a permanenza?	Il mantenimento del sistema di drenaggio continuamente chiuso e sterile	La pulizia settimanale della zona genitale del paziente e del meato urinario	L'irrigazione vescicale di routine	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1436	Durante il riposo a letto, quale posizione deve adottare un paziente di chirurgia toracica nel post-operatorio?	Posizione di semi-Fowler, con il terzo superiore del letto a 30-45 gradi	Posizione prona	Posizione supina	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1437	Quale fra le seguenti malattie può essere trasmessa per via aerea?	La tubercolosi	IVU	L'AIDS	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1438	Nella valutazione dello screening nutrizionale possono essere applicate le seguenti scale:	MNA (Mini nutritional assessment)	Nessuna delle altre alternative è corretta	Di Painad	Di Tinetti	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1439	"Rimuovere immediatamente qualsiasi catetere intravascolare che non sia più strettamente necessario." Questa affermazione è:	Vera, tutti i cateteri venosi, arteriosi, centrali o periferici devono essere rimossi il prima possibile e comunque non appena non siano più strettamente necessari, per diminuire il rischio di infezioni	Falsa perché devono essere lasciati in sito anche cateteri inutilizzati se si prevede che possano avere un utilizzo successivo (possibile aggravamento del paziente, possibile insorgenza di complicanze)	Falsa, i cateteri venosi centrali e quelli arteriosi vanno rimossi solo nel momento della dimissione del paziente dall'ospedale	Falsa perché devono essere lasciati in sito anche cateteri inutilizzati se il paziente è anziano e il patrimonio venoso scarso	IGIENE
1440	Secondo le più recenti Linee Guida per la prevenzione del rischio infettivo la medicazione del sito d'inserzione del CVC, con medicazione trasparente, deve essere effettuata:	ogni 7 giorni	mai	ogni 3 giorni	ogni giorno	IGIENE
1441	Secondo le raccomandazioni dell'OMS quanti e quali sono i "momenti fondamentali" per l'igiene delle mani?	5:Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo esposizione ad un liquido biologico; dopo il contatto con il paziente;dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente	5: Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo una manovra asettica; dopo il contatto con il paziente; dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente	3: Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo esposizione ad un liquido biologico	Non esistono raccomandazioni OMS in merito	IGIENE
1442	Quale tra i seguenti interventi NON è appropriato in caso di paziente portatore di catetere vescicale?	Utilizzare talco dopo l'igiene perineale	Fissare il catetere alla coscia o all'addome	Tenere la sacca di drenaggio sotto il livello della vescica dell'assistito	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1443	Per un soggetto HIV positivo, che tipo di precauzioni vanno adottate?	Standard	Contatto	Aerea	Droplets	IGIENE
1444	Quando il paziente è in posizione supina, potrebbero svilupparsi lesioni da pressioni nelle seguenti zone:	nuca, sacro, scapole, talloni	malleolo, gomito, orecchio	orecchio, sacro, ginocchio	sacro, ginocchio, scapole	IGIENE
1445	Per quanto riguarda l'alimentazione di una persona anziana, in assenza di controindicazioni, si consiglia di:	aumentare l'apporto di calcio nella dieta	eliminare le fibre dalla dieta	limitare l'apporto di liquidi	aumentare l'apporto di sodio quotidiano	IGIENE
1446	La medicazione di un catetere venoso centrale deve essere effettuata passando la soluzione disinfettante:	dall'interno verso l'esterno in modo circolare	dall'esterno verso l'interno in modo circolare	dall'esterno verso l'interno a raggiera	nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1447	Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:	Prima di eseguire procedure invasive	Al termine delle attività di strumentazione perioperatoria	Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1448	Come si trasmette il virus Sars-Cov-2:	In modo diretto, indiretto e per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso	Solo per contatto diretto	Solo per contatto stretto	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1449	Il calibro del catetere vescicale si misura in:	In Charrier	In Mercier	In Gauge	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1450	Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile:	L'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione	La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile	L'applicazione di garze grasse sulla lesione	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1451	L'apertura di una ferita è chiamata:	Deiscenza	Infezione	Formazione di ernia	Sventramento	IGIENE
1452	Quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza?	Infezione delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi	Polmoniti, tubercolosi, infezione delle vie urinarie ed infezione della ferita chirurgica	Infezione delle vie urinarie, gastroenteriti, infezione della ferita chirurgica e congiuntivite	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1453	Cosa s'intende per bilancio idrico?	L'insieme dei processi che consentono di bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nell'arco delle 24 ore, cioè il rapporto tra liquidi introdotti ed eliminati	La stima approssimativa dei liquidi reintegrati attraverso la dieta	L'insieme dei processi che consentono di bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nell'arco delle 12 ore, cioè il rapporto tra liquidi introdotti ed eliminati	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1454	Per garantire un adeguato riposo e sonno è necessario tenere in considerazione il microclima, che è caratterizzato da:	temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione, rumore	arredi in generale, illuminazione, temperatura, umidità, ventilazione, rumore	tipologia di materasso, temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1455	Il fabbisogno medio di acqua per una persona adulta è di circa:	1,5-2 litri al giorno	2,5-3 litri al giorno	1-1,2 litri al giorno	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1456	In quale tipo di pazienti è più importante la cura dei piedi?	Nei pazienti diabetici	Nei pazienti nefropatici	Nei pazienti influenzati	Nei pazienti traumatizzati	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1457	Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?	Quando si indossano i guanti, rimuoverli nel passare da un sito del corpo pulito ad uno contaminato	Usare i guanti tutte le volte che ci si aspetti di venire in contatto con sangue o altro materiale potenzialmente infetto, membrane, mucose o cute non intatta	L'utilizzo dei guanti non è sostitutivo dell'igiene delle mani	Rimuovere i guanti dopo aver assistito il paziente	IGIENE
1458	Secondo le più recenti Linee Guida per la prevenzione del rischio infettivo il CVP nel neonato deve:	essere sostituito solo quando vi siano segni di infezione o infiammazione (flebite) o malfunzionamento e prontamente rimosso alla sospensione della terapia endovenosa	essere sostituito ogni 24 ore e lasciato in sede per altre 24 ore dopo la sospensione della terapia endovenosa	essere sostituito ogni 72 ore fino alla sospensione della terapia endovenosa	essere sostituito ogni 96 ore fino alla sospensione della terapia endovenosa	IGIENE
1459	La pratica del lavaggio delle mani effettuata correttamente consente:	la riduzione del rischio di trasmissione di patogeni dall'operatore al paziente, dal paziente all'operatore e da paziente a paziente, anche attraverso l'ambiente	l'aumento del rischio di trasmissione di patogeni da operatore a paziente e da paziente a paziente	la riduzione del rischio di trasmissione di patogeni dall'operatore al paziente ma l'aumento del rischio di trasmissione da paziente ad operatore	l'azzeramento del rischio di trasmissione di patogeni dall'operatore al paziente e da paziente a paziente	IGIENE
1460	"Eseguire la tricotomia aumenta il rischio di infezione del sito chirurgico, in special modo se si utilizzano i rasoi manuali e il rischio aumenta se questa viene praticata il giorno prima dell'intervento". Secondo le Linee Guida questa affermazione è:	Vera: la tricotomia non andrebbe mai praticata (a meno che i peli non interferiscano con l'intervento). Se si effettua la tricotomia praticarla il giorno stesso dell'intervento preferibilmente con clipper elettrico con lame monouso	Falsa: la tricotomia diminuisce il rischio di infezione e deve essere praticata sempre, con qualunque strumento e senza indicazioni sui tempi	Vera ma incompleta: la tricotomia deve sempre essere effettuata nei pazienti immunodepressi e negli individui di colore	Falsa: la tricotomia non dovrebbe essere praticata solo per interventi agli arti inferiori ma deve sempre essere effettuata negli interventi sull'addome, preferibilmente con rasoio manuale monouso bilama	IGIENE
1461	Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:	infezione delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi	tubercolosi, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, infezioni delle vie urinarie	Infezione vie urinarie, gastroenteriti, infezione della ferita chirurgica, tubercolosi	polmoniti, tubercolosi, infezioni delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica	IGIENE
1462	Nell'esecuzione del lavaggio sociale delle mani è buona norma adottare le seguenti precauzioni tranne una. Quale?	Usare gli spazzolini per le unghie	Usare un detergente	Asciugarsi con salviettine monouso o aria calda	Asportare anelli, bracciali orologio	IGIENE
1463	Nel riposizionamento a letto, quale fra le seguenti posizioni l'infermiere dovrà fare assumere alla persona con lesione da pressione in sede sacrale, al fine di alleviare la pressione sulle prominente ossee dorsali e sacrali?	Laterale destra o sinistra	Posizione di anti-Trendelenburg	Semi-Fowler	Incrociata	IGIENE
1464	Quale dei seguenti atteggiamenti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere?	Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere il lavaggio delle mani	Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere il ricambio della biancheria	Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere l'utilizzo dei flussi d'aria laminari	Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere la corretta dislocazione dei farmaci	IGIENE
1465	Quale delle seguenti affermazioni sulla distribuzione delle calorie nel trattamento dietetico di una persona con diabete di tipo 2 è corretta?	Almeno la metà delle calorie assunte quotidianamente deve derivare dai carboidrati	Deve contenere un apporto calorico pari tra carboidrati, grassi e proteine	L'apporto calorico deve essere determinato prevalentemente dall'assunzione di frutta	La percentuale maggiore delle calorie assunte quotidianamente deve essere determinata dall'apporto protidico	IGIENE
1466	Per eseguire l'igiene del cavo orale in un paziente incosciente, è opportuno metterlo nella:	posizione laterale	posizione di Trendelenburg	posizione di Fowler	posizione seduta	IGIENE
1467	Individuare, tra i seguenti, un possibile effetto indesiderato della somministrazione di clistere evacuativo.	Crisi vagale	Iperglicemia transitoria	Cefalea	Bradipnea e sonnolenza	IGIENE
1468	Per quale motivo è necessario far rimuovere alla persona le protesi dentarie mobili prima del suo ingresso in camera operatoria?	Per evitare il rischio di caduta nel retrobocca/vie aeree/vie digestive con ostruzione delle stesse	Per evitare il rischio di caduta solo nelle vie digestive con ostruzione delle stesse	Per evitare il rischio di caduta in bocca/retrobocca ed espulsione delle stesse	Per evitare il rischio di caduta solo nella cavità nasale con ostruzione della stessa	IGIENE
1469	Un paziente degente in terapia intensiva per complicanze post-operatorie ha in corso la nutrizione enterale attraverso sondino nasogastrico. La miscela prescritta prevede l'integrazione di elementi nutrizionali quali arginina, glutammina, acidi grassi omega 3. Questa integrazione ha lo scopo di:	migliorare la risposta immunitaria	migliorare la motilità	migliorare la tollerabilità	prevenire la comparsa di diarrea	IGIENE
1470	Al rientro dalla sala operatoria dopo intervento per un'occlusione intestinale, l'infermiere effettua il primo controllo post-operatorio a una persona di 68 anni. Con quale frequenza è raccomandabile eseguire i successivi controlli dei parametri e delle condizioni cliniche del paziente?	Ogni ora per le prime 4 ore e successivamente ogni 4 ore	Dopo un'ora e poi pressione arteriosa e frequenza cardiaca ogni 6 ore, emocromo a 8 ore dal rientro in reparto e, se le condizioni sono stabili, al bisogno	Ogni ora per le successive 24 ore	Il paziente necessita di una presenza costante per almeno 48 ore che possa segnalare al personale ogni variazione utile dei parametri vitali	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1471	Per quanto riguarda la gestione della ferita, il tipo di medicazione in schiuma in poliuretano idrofilico si utilizza per:	ferite con perdita totale o parziale di spessore, con scarso o medio drenaggio: la schiuma provvede all'assorbimento e protezione	ferite infette: la schiuma ha un'azione antimicrobica e antiparassitaria	ferite profonde o moderatamente secernenti: la schiuma provvede all'assorbimento	ferite a tutto spessore o a spessore parziale: la schiuma promuove la granulazione e il debridement autolitico per rimuovere il tessuto necrotico	IGIENE
1472	L'igiene del cavo orale, l'aspirazione delle secrezioni e il posizionamento dell'assistito con il tronco sollevato di 30-45° sono interventi infermieristici atti a prevenire:	la polmonite associata a intubazione endotracheale	l'insorgenza di lesioni a carico del cavo orale	la dislocazione del tubo endotracheale	la rimozione accidentale del catetere di Swan-Ganz	IGIENE
1473	L'iperemia della cute, che non scompare dopo digitopressione, denota una lesione da pressione:	al primo stadio	al terzo stadio	al secondo stadio	al quarto stadio	IGIENE
1474	Quale tra le seguenti NON è un'indicazione al posizionamento di catetere vescicale?	Neoplasia del bacinetto renale o dell'uretere, per il quale sia stato posizionato uno stent	Quando è necessario iniettare mezzi di contrasto in vescica a scopo diagnostico	Ritenzione urinaria o assenza di riflesso neurologico vescicale	Mantenere la vescica vuota in caso di interventi chirurgici a carico delle vie urinarie	IGIENE
1475	Nel riposizionamento a letto, per favorire la ventilazione e migliorare la gittata cardiaca, l'infermiere dovrà far assumere al paziente la posizione:	di Fowler	genupettorale	supina	prona	IGIENE
1476	Durante il lavaggio chirurgico delle mani è assolutamente necessario:	bagnare mani e avambracci tenendo le mani più in alto dei gomiti	bagnare mani e avambracci tenendo i gomiti più in alto delle mani	bagnare prima gli avambracci e poi le mani	usare la soluzione alcolica di clorexidina gluconato	IGIENE
1477	Quali caratteristiche deve avere un sapone utilizzato per il lavaggio di un paziente ospedalizzato?	PH neutro, poco schiumogeno, facile da risciacquare, non profumato, costo contenuto	PH leggermente basico per migliorare la disidratazione cutanea, facile da risciacquare, non profumato	Possono essere utilizzati tutti i tipi di saponi	Solo pH neutro e basso costo	IGIENE
1478	Il pronto soccorso avvisa il reparto di degenza che sta inviando per il ricovero una persona affetta da scabbia. Quali precauzioni dovrà adottare il personale di assistenza per evitare la trasmissione della malattia?	Indossare un camice monouso e i guanti da cambiare ogniqualvolta abbia contatti con la persona, programmare interventi di pulizia straordinaria per la stanza di degenza e, se possibile, accoglierla in una stanza singola	Indossare i mezzi di protezione previsti dall'isolamento per contatto all'entrata della stanza e rimuoverli prima di uscire	Metterla subito in isolamento ed evitare qualsiasi tipo di contatto	Indossare un camice e i guanti per tutti i contatti con la persona, che sarà posta in degenza con altri soggetti portatori di stati infetti di altri generi	IGIENE
1479	Quali interventi infermieristici sono indicati per la prevenzione della polmonite associata a intubazione endotracheale in un assistito degente in Terapia Intensiva e intubato da 8 giorni?	Praticare l'igiene del cavo orale, aspirare le secrezioni, posizionare l'assistito con il tronco sollevato di 30-45 gradi	Praticare l'igiene del cavo orale, evitare l'aspirazione delle secrezioni sottoglottiche, posizionare l'assistito con il tronco sollevato di 90 gradi	Praticare l'igiene del cavo orale, eseguire il monitoraggio emogasanalitico biorario, posizionare l'assistito supino	Praticare l'igiene del cavo orale, incrementare la sedazione, posizionare l'assistito supino	IGIENE
1480	Il carcinoma della cervice uterina si associa in più del 95% dei casi a infezione da:	Papillomavirus umano (HPV)	Virus di Epstein-Barr (EBV)	Candida Albicans	Virus erpetico ottavo (HHV8)	IGIENE
1481	La sacca di raccolta delle urine collegata al catetere vescicale deve essere mantenuta:	al di sotto del livello della vescica	al livello della vescica	non è importante considerare il livello rispetto alla vescica	al di sopra del livello della vescica	IGIENE
1482	Cosa si intende con l'espressione "bilancio idrico":	il monitoraggio dei liquidi sia introdotti sia eliminati dal paziente	la media aritmetica dei parametri vitali rilevati al paziente nelle ultime 48 ore	il monitoraggio dei soli liquidi introdotti dal paziente	il monitoraggio dei soli liquidi eliminati dal paziente	IGIENE
1483	Quale tra i seguenti provvedimenti riveste maggiore efficacia nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?	L'igiene delle mani	L'utilizzo di flussi ad aria laminare	L'utilizzo di disinfettanti per pavimenti	La nebulizzazione di formaldeide	IGIENE
1484	Quale delle seguenti indicazioni si deve dare a una persona sottoposta a chemioterapia per eseguire l'igiene del cavo orale?	Utilizzare spazzolini a setole morbide	Usare garze morbide e filo interdentale ogni sera	Usare solo collutori a base alcolica	Usare dei rilevatori di placca per rimuoverla completamente	IGIENE
1485	La cura quotidiana del meato urinario in presenza di catetere vescicale prevede l'utilizzo di:	acqua e sapone	clorexidina al 2%	pomata antibiotica	iodopovidone al 10%	IGIENE
1486	"Lesione cutanea a spessore totale con degenerazione o necrosi del tessuto sottocutaneo, e con possibile estensione fino alla fascia muscolare, ma non oltre" è la definizione di una lesione al:	terzo stadio	primo stadio	quarto stadio	secondo stadio	IGIENE
1487	Quale delle seguenti affermazioni riguardo all'uso dei guanti come mezzo di barriera è corretta?	I guanti riducono l'incidenza della contaminazione delle mani ma non prevengono le lesioni dovute ad aghi	I guanti non sterili vanno indossati prima di reincappucciare gli aghi usati	I guanti sterili vanno indossati prima di venire in contatto con secreti ed escreti corporei	I guanti sterili vanno indossati prima di indossare il camice sterile	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1488	Il sistema di isolamento basato sulle precauzioni universali richiede:	di considerare tutti i pazienti potenzialmente infetti per le malattie che si trasmettono attraverso il sangue e altri liquidi biologici	l'utilizzo di misure di barriera ogni qualvolta si entri in contatto con il paziente	l'isolamento del paziente in stanza singola	l'isolamento immediato e stretto, tramite precauzioni standard e aggiuntive, dei pazienti sintomatici	IGIENE
1489	L'agente patogeno della malaria è:	il Plasmodium falciparum	il Dictyostelium discoideum	il Saccharomyces cerevisiae	il Bacillus subtilis	IGIENE
1490	L'effettuazione di una medicazione semplice è:	eseguita dall'operatore socio-sanitario in collaborazione con l'infermiere	un'urgenza medica e dunque eseguita in sala operatoria dal chirurgo	decisa dall'operatore socio-sanitario in autonomia	eseguita esclusivamente dall'infermiere	IGIENE
1491	L'impiego dell'acqua ossigenata permette:	una veloce ed efficace rimozione degli essudati	l'eliminazione di tutti i microrganismi	di rinfrescare la pelle del paziente	l'eliminazione di tutta la flora batterica	IGIENE
1492	"Parziale perdita di spessore del derma, che si presenta come un'ulcera aperta, superficiale, con colore rosso, senza fibrina" è caratteristica di una lesione da pressione:	al secondo stadio	al primo stadio	non classificabile	al sesto stadio	IGIENE
1493	Nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da pressione, occorre evitare di:	frizionare e sfregare la cute, specialmente in corrispondenza delle prominenze ossee	valutare insieme al personale infermieristico la necessità di posizionare un materasso antidecubito	mantenere il più possibile la cute pulita e asciutta	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1494	Durante la preparazione del sistema di un drenaggio toracico a valvola ad acqua che cosa deve fare l'infermiere?	Garantire l'asepsi, riempire la camera di aspirazione con acqua sterile fino al segno presente sulla camera di drenaggio	Riempire la camera con soluzione fisiologica, senza adottare manovre di particolare sterilità	Garantire l'asepsi, riempire la camera di aspirazione con acqua sterile oltre il segno presente sulla camera di drenaggio	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1495	Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da:	batteri	protozoi	virus respiratori	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1496	Nella fase preoperatoria, quando deve essere effettuata l'eventuale tricotomia dell'area di incisione cutanea?	Immediatamente prima dell'intervento chirurgico	Sei ore prima dell'intervento chirurgico	La sera prima dell'intervento chirurgico	Immediatamente dopo l'intervento chirurgico	IGIENE
1497	Vengono definite Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA):	Le infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione	Nessuna delle altre risposte è corretta	Le infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima dell'erogazione dell'assistenza potevano già essere manifeste clinicamente o in incubazione	Le infezioni dovute unicamente a batteri, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione	IGIENE
1498	In quali fasi del processo di assistenza l'intervento dell'OSS può rendersi necessario?	Attuazione degli interventi infermieristici	Pianificazione e attuazione degli interventi infermieristici	Pianificazione, attuazione e valutazione degli interventi infermieristici	Tutte le fasi del processo di assistenza	IGIENE
1499	Quali sono i parametri presi in considerazione da E. Norton per valutare il rischio d'insorgenza delle lesioni da decubito?	Condizioni fisiche, stato mentale, deambulazione, mobilizzazione, incontinenza	Igiene, alimentazione, sudorazione, peso, mobilità a letto	Condizioni fisiche, igiene, alimentazione, stato mentale, idratazione	Deambulazione, mobilizzazione, peso, idratazione, incontinenza	IGIENE
1500	Quali dei seguenti fattori possono influenzare negativamente la guarigione di una ferita?	Sepsi e deficit nutrizionali	Dieta iperproteica	Vomito e diarrea	Febbre	IGIENE
1501	Il lavaggio antisettico delle mani ha l'obiettivo di:	ridurre il numero di batteri residenti e transitori dalle mani	eliminare i residui biologici e tutti i batteri, spore comprese, dalle mani	eliminare tutti i batteri residenti e transitori dalle mani	eliminare i residui biologici dalle mani	IGIENE
1502	Per effettuare la medicazione di una ferita asettica l'infermiere deve procedere:	dal centro alla periferia, mantenendo l'asepsi chirurgica	dal centro alla periferia, mantenendo l'asepsi medica	indifferentemente dalla periferia al centro o viceversa, mantenendo l'asepsi chirurgica	dalla periferia al centro, mantenendo l'asepsi chirurgica	IGIENE
1503	Per effettuare un clistere il paziente deve assumere la seguente posizione:	laterale sinistra con la gamba destra flessa	prona con le gambe flesse	indifferente purché il paziente sia comodo	laterale con la gamba sinistra flessa	IGIENE
1504	La nutrizione parenterale si somministra:	nella via ematica	nello stomaco, nel duodeno nel digiuno	nel circolo collaterale	per via orale	IGIENE
1505	La terapia dietetica nel paziente affetto da epatite cronica scompensata è:	iposodica e ipoproteica	iposodica e iperglucidica	iposodica e ipocalorica	iposodica e iperproteica	IGIENE
1506	Il lavaggio delle mani prima di iniziare una procedura infermieristica è necessario:	sempre	solo se si indossano guanti sterili	solo se l'infermiere presenta delle soluzioni di continuo (ferite, abrasioni) sulle mani	solo se non si indossano guanti puliti	IGIENE
1507	Per effettuare l'urinocoltura in una persona con minzione spontanea, deve essere raccolto:	un campione di urina del mitto intermedio in contenitore sterile previa detersione e disinfezione del meato uretrale	un campione di urina mediante cateterismo estemporaneo in contenitore sterile	un campione di urina del mitto intermedio in contenitore pulito previa detersione e disinfezione del meato uretrale	un campione di urina dalla diuresi delle 24 ore in contenitore sterile previa disinfezione	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1508	In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali?	Sempre, indipendentemente dalla natura del soggetto sul quale sono stati impiegati	Solo quando sono stati utilizzati per soggetti HIV-positivi	Solo nell'ambito del servizio di pronto soccorso	Solo quando sono stati utilizzati per soggetti tossicodipendenti	IGIENE
1509	In una persona portatrice di drenaggio toracico:	il vaso di raccolta deve essere costantemente posto sotto il livello del torace della persona	si consiglia alla persona il decubito supino	non si deve mai sostituire il vaso di raccolta	il vaso di raccolta deve contenere soluzione sterile con eventuale antibiotico	IGIENE
1510	Al termine di un'iniezione, l'infermiere deve gettare la siringa e l'ago negli appositi contenitori:	senza rimettere il cappuccio protettivo sull'ago	rimettendo il cappuccio protettivo sull'ago	sterilizzando l'ago prima di incappucciarlo	spezzando l'ago, dopo averlo staccato dalla siringa	IGIENE
1511	Cos'è il condom?	Un presidio per consentire la raccolta delle urine	Un presidio per consentire l'eliminazione del versamento pleurico	Un presidio per consentire la nutrizione parenterale	Un presidio per consentire l'eliminazione fecale	IGIENE
1512	Dopo aver somministrato la terapia orale mediante sondino a una persona impossibilitata a deglutire, l'infermiere deve:	chiudere il sondino per almeno mezz'ora	nessuna delle altre alternative è corretta	lasciare aperto il sondino	ricollegare il raccoglitore al sondino	IGIENE
1513	La cura di un'area della cute sottoposta a radioterapia prevede di:	Mantenere il sito asciutto e pulito per tutto il periodo di trattamento	Eeguire impacchi giornalieri con alcol	Applicare crema all'ossido di zinco una volta al giorno	Mantenere il sito umido	IGIENE
1514	Quali sono i metodi di alimentazione mediante sondino enterale?	Tutte le altre risposte sono corrette	In continuo, mediante una pompa che eroga la quantità prescelta di alimentazione nel numero di ore specificato	Infusione intermittente (con o senza pompa)	Con una siringa per somministrare volumi maggiori di alimento (bolo) a intervalli di tempo prestabiliti nell'arco della giornata	IGIENE
1515	Le precauzioni standard per prevenire la trasmissione delle infezioni, prevedono:	Utilizzo dei DPI, lavaggio corretto delle mani e delle superfici cutanee dopo contatto con fluidi corporei, gestione attenta di strumenti taglienti, isolamento degli assistiti infetti	Isolamento degli assistiti solo nel caso di infezioni chirurgiche	Utilizzo di guanti monouso sterili	Unicamente il lavaggio chirurgico delle mani	IGIENE
1516	Quale prodotto per l'igiene del cavo orale può ulteriormente ridurre l'incidenza di polmonite associata a ventilazione meccanica?	Clorexidina Gluconato al 2%	Candeggina 00	Acqua Ossigenata	Soluzione fisiologica 0,9%	IGIENE
1517	I principali interventi volti a prevenire le lesioni da pressione nei soggetti a rischio sono:	mobilizzazione dell'assistito, nutrizione adeguata e protezione della cute	nutrizione adeguata e sfregamento quotidiano della cute delle zone a rischio	riposo a letto e dieta dimagrante	nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1518	Lo strumentario chirurgico si definisce sterile se è:	privo di qualsiasi tipo di microrganismo, anche sotto forma di spora	nessuna delle altre risposte è corretta	privo di microrganismi patogeni	privo di microrganismi non patogeni	IGIENE
1519	Il lavaggio sociale delle mani:	prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani	si effettua solo dopo aver effettuato una medicazione	non è necessario se si indossano i guanti	si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio	IGIENE
1520	Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da legionellosi, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?	Sono sufficienti le precauzioni standard: non sono necessari dispositivi di protezione individuale aggiuntivi in quanto la malattia non è trasmessa da persona a persona	Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e filtrante facciale a protezione 10 nei contatti con il malato	Non dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso nei contatti col malato	Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso, filtrante facciale a protezione 10 e occhiali nei contatti con il malato	IGIENE
1521	La trasmissione di Salmonella typhi avviene:	per via oro-fecale	per via aerea	per via sessuale	per contatto parenterale	IGIENE
1522	Per "deiscenza di una ferita" si intende:	apertura o mancata chiusura delle labbra della ferita stessa	una ferita che presenta adesioni con superfici contigue	una ferita che presenta espulsione di molti liquidi	una ferita che presenta cellule morte	IGIENE
1523	Un disinfettante si definisce batteriostatico:	quando inibisce la proliferazione batterica inattivando i microrganismi	quando non è in grado di agire sui virus	quando elimina la carica batterica	quando uccide i batteri inattivandoli	IGIENE
1524	La lebbra è una malattia provocata da quale dei seguenti microrganismi?	Mycobacterium	Pasteurella	Brucella	Xylella	IGIENE
1525	Quale tra i seguenti NON è l'agente eziologico di una tossinfezione alimentare?	Clostridium tetani	Bacillus cereus	Salmonella enteritidis	Clostridium perfringens	IGIENE
1526	In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza, è indicato scegliere cateteri:	in silicone o in siliconato in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi	vescicali a tre vie per eseguire lavaggi vescicali in caso di infezioni	vescicali in lattice in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi	vescicali a tre vie per eseguire esami uro dinamici e culturali in sicurezza	IGIENE
1527	Lo smaltimento degli escreti dei soggetti contaminati da tossina botulinica, deve avvenire attraverso:	incenerimento o passaggio in autoclave a temperature di almeno 120 °C	il medesimo percorso dei farmaci scaduti	passaggio in autoclave anche a temperature di 90 °C	incenerimento immediato	IGIENE
1528	Nel rifacimento del letto occupato:	è utile la presenza di due persone	nessuna delle altre risposte è corretta	è utile chiedere al paziente di mantenere il respiro	è importante obbligare tutti gli altri pazienti a uscire dalla stanza	IGIENE

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1529	Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta ERRATO per la prevenzione di crampi addominali, flatulenza e distensione gastrica?	Al termine dell'alimentazione eseguire un lavaggio del lume della sonda, disconnettere la siringa e solo successivamente clampare la sonda	Al termine della somministrazione, eseguire il lavaggio del lume, clampare la sonda e solo successivamente disconnettere la siringa o il circuito	A ogni somministrazione, riempire la siringa a cono centrale con la formula alimentare, rimuovendo eventuali bolle d'aria formatesi durante l'aspirazione della stessa	All'inizio della somministrazione, clampare la sonda gastrostomica o il sondino nasogastrico, rimuovere il tappo e successivamente connettere la siringa a cono centrale o il circuito	IGIENE
1530	Indicare la sequenza corretta delle azioni che l'infermiere deve compiere per eseguire l'igiene delle mani con soluzione alcolica. 1. Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani. 2. Frizionare con la mano destra, con movimento rotatorio, in avanti e indietro le dita strette tra di loro nel palmo sinistro e viceversa. 3. Frizionare con il palmo della mano destra il dorso della mano sinistra, intrecciando le dita tra di loro e viceversa. 4. Frizionare palmo contro palmo, intrecciando le dita tra di loro. 5. Frizionare le mani palmo contro palmo. 6. Frizionare il dorso delle dita con il palmo opposto tenendo le dita strette tra di loro. 7. Frizionare, con movimento rotatorio, il pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa.	1 - 5 - 3 - 4 - 6 - 7 - 2	1 - 7 - 5 - 6 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 3 - 5	7 - 5 - 3 - 2 - 6 - 1 - 4	IGIENE
1531	Durante le manovre di igiene intima del paziente allettato:	è preferibile posizionare la padella e si procede al lavaggio con acqua e sapone	si fa assumere al paziente il decubito laterale per consentire un migliore accesso alle regioni da pulire con disinfettante sterile	si utilizza acqua tiepida con soluzione iodata	nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1532	Per quali tipi di patogeni vengono utilizzati gli antibiotici?	I Batteri	I Funghi	I Virus	Nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1533	La clorexidina è un disinfettante che agisce:	sui miceti e sui batteri gram-positivi e gram-negativi	sui miceti, sulle spore e sui virus	sui batteri gram-positivi e sui virus	nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1534	Per la prevenzione delle infezioni CVC correlate è raccomandato di praticare l'igiene delle mani:	prima e dopo la palpazione della sede d'inserzione	solo prima della palpazione della sede d'inserzione	solo prima delle procedure di sostituzione	nessuna delle altre risposte è corretta	IGIENE
1535	La pulizia dell'orifizio anale viene eseguita con il paziente:	posizionato sul fianco	nessuna delle altre risposte è corretta	in posizione prona	in posizione Fowler	IGIENE
1536	Uno degli scopi di una medicazione a piatto attuata su una ferita chirurgica semplice in via di normale guarigione è:	proteggere da infezioni	ritardare la cicatrizzazione	prevenire il sanguinamento	rilasciare endorfine	IGIENE
1537	La trasmissione dell'epatite C (HCV):	avviene per via ematica	nessuna delle altre risposte è corretta	avviene per via respiratoria	non è dimostrata scientificamente	IGIENE
1538	Un soggetto allergopatico che deve subire un intervento chirurgico in anestesia generale viene sottoposto a una premedicazione. Tale procedura prevede l'utilizzo di:	cortisonici	antipiretici	probiotici	antibiotici	IGIENE